

Ⓕ Verzeichniß

der

In - und ausländischen Gewächse
an Blumen, Stauden, Sträuchern
und Bäumen,

welche sich dormalen im hiesigen hochfürstlichen
Hof - und Residenzgarten
vorfinden, und sowohl

Im Freyen, als in Glas-und Treibhäusern
gezogen, und veribahrt werden.

Zur Bequemlichkeit und Erinnerung der Gar-
tenfreunde bekannt gemacht

von

J o h a n n M a y e r

hochfürstlichen Hofgärtner allhie zu Wirzburg.



Mayer
Verzeichniß
in- u. auß-
ländischen
Gewächse

1 7 8 6.

W i r z b u r g,

gedruckt bey Fran: Sebastian Sartorius, Hofbuchdrucker.

104 Gensler



BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS

Zur Nachricht.

Da man nach und nach verschiedene Verzeichnisse der hiesigen Gewächse zu liefern gedenket, so dienet zur Erläuterung daß solche enthalten:

Erstes Verzeichniß: Die Sommer - oder solche Gewächse, welche alljährlich wieder vergehen, und frisch angebaut werden müssen.

Solche sind mit ☉ bezeichnet.

Wo hieben noch * steht, bedeutet es eine zarte Pflanze, die eine warme Sommerlage erfordert.

Zweytes Verzeichniß enthält die sogenannten perennirenden, oder etliche Jahre lang dauernden, und im Frühlinge wieder nach Abwerfung der alten Stängel frisch aus der Wurzel treibenden Gewächse.

Sie sind mit v bemerket.

Drittes Verzeichniß der Gewächse, welche über Winters theils in Glashäusern, theils

in warmen Treibhäusern aufbewahrt
werden müssen.

Die bey diesen befindlichen Zeichen bedeuten:

h einen hohen Baum.

2 , , mittelmäßigen dergl.

♂ hohe Stauden.

♀ niedere Stauden.

♀ kletternde oder kriechende Stauden.

V deren Stängel im Winter abfallen.

* zarte Treibhausgewächse.

Viertes Verzeichniß ausländischer oder mei-
stens nordamerikanischer Bäume und
Sträucher, welche wegen Schönheit und
Merkwürdigkeit des Laubes, der Blumen,
Holzes und Wuchses einen Vorzug ver-
dienen, diese sind mit Δ bezeichnet.

Ben diesen gelten obgedachte Unterschei-
dungszeichen ebenfalls, und das dabey steh-
ende * bedeutet, daß man das Gewächs im
Winter etwas verwahren müsse.

Fünftes Verzeichniß aller Blumen, Zwiebeln
und Knotengewächse, deren schöne Blume
die Zierde unserer Gärten ausmachen.

Ihr

Ihr Kennzeichen ist ∞

† bedeutet, daß es mehrere Jahre hintereinander im Grunde bleiben könne.

* müssen im Binder bedeckt werden.

** müssen durchs ganze Jahr im Treibhause bleiben.

Sechstes Verzeichniß der hitzigsten Pflanzen
aus Afrika, beyden Indien und Südamerika, davon die meisten in warmen Lohbeeten und Treibhäusern aufbehalten werden müssen. Solche sind mit † bezeichnet, und die zartesten mit *

Bei fernerer Vermehrung dieser Sammlung wird man den Zuwachs jährlich auf einem besondern Blatte nachtragen, auch Liebhabern mit diesen Gewächsen in sehr billigen Preisen zu Diensten stehen, welche man benennen wird, sobald jemand die beliebigen Nummern bestimmet.



Erstes Verzeichniß

Sommergewächse nach linäischer Benennung.

Nro ①

	quint.	fl.	fr.
1 ADONIS <i>autumnalis</i> , Sp. 2. fol. 771. Flos adonis hortensis flore minore atro- rubente.	-	-	4
2 ALCEA <i>chinensis</i> flore elegantur rubro, varietas. Malva hortensis.	-	-	4
3 AMARANTHUS <i>tricolor</i> , Sp. 3. fol. 1403. * Amaranthus tricolor folio variegato.	-	-	5
4 AMARANTHUS <i>melancholicus</i> , Sp. 4. fol. 1403. Amaranthus bicolor.	-	-	4
5 ASTER <i>chinensis</i> flore cœruleo, rubro & albo pleno. Sp. 35. fol. 1232. Aster annuus flore ingenti specioso pleno.	-	-	3
6 ASTER <i>chinensis</i> fistuloso flore elegan- tissimo, colore triandris. Aster fistulosus.	-	-	5
7 ASTER <i>chinensis</i> flore ranunculoides colore triandris. Aster nanunculoides.	-	-	3
8 ATHANASIA <i>annua</i> , Sp. 9. fol. 1182. Chrysanthemum corymbiferum.	-	-	4
9 ATRIPLEX <i>hortensis</i> rubra β fol. 1494 Atriplex sylvestris annua.	-	-	5



Erstes Verzeichniß

Der Sommergewächse deutsche Benennung.



Nro

- 1 Sommer - Adonis mit rothen Blumen.
- 2 Neue Sommerpappel mit weißen und rothen makulirten Blumen.
- 3 Amaranth oder dreifarbiger Tausendschön.
- 4 Zweifarbiger Amaranth oder Tausendschön.
- 5 Sommer - Aster mit weißen, blauen, rothen, und mannigfältig groß gefüllten Blumen.
- 6 Fistulose Aster eine ganz neue Sorte ist die schönste von mannigfältigen Farben.
- 7 Ranunkel Aster von vielerley Farben und gefüllten Blumen.
- 8 Afrikanische Athanasia oder Goldhaarstaude.
- 9 Nelke von rothen und vielen Farben.

Nro ②

	quint.	q.	fr.
10 ATROPA <i>Physalodes</i> Sp. 3. fol. 260. Alkekengi amplo flore violaceo.	-	-	4
11 BLITUM <i>capitatum</i> . Sp. 1. fol. 6. Attriplex baccifera.	-	-	3
12 CALENDULA <i>officinalis</i> . Sp. 3. fol. 1304. Calta vulgaris.	-	-	2
13 CALENDULA <i>pluvialis</i> . Sp. 4. Calendula foliis dentatis.	-	-	4
14 CALENDULA <i>hybrida</i> . Sp. 5. Calta africana flore intus albo, foris violaceo, semine majore oblongo.	-	-	5
15 CAPSICUM <i>annuum</i> . Sp. 1. fol. 270. Piper Indicum cum suis varietatibus.	-	-	2
16 CARDIOSPERMUM <i>corindum</i> . Sp. 1. fol. 525. Pisum vesicarium fructu nigro alba ma- cula notato.	-	-	2
17 CARTHAMUS <i>tinctorius</i> . Sp. 1. fol. 1162. Crocus vulgaris.	-	-	3
18 CELOSIA <i>christata</i> . Sp. 3. fol. 297. Amaranthus paniculacon glomerata.	-	-	6
19 CENTAUREA <i>Crupina</i> . Sp. 1. fol. 1285. Senecio-Carduus opulus.	-	-	5
20 CENTAUREA <i>Cyanus</i> flore varietato. Sp. 14. fol. 1289. Cianus arvensis, vulgaris, aut segetum.	-	-	4
21 CHEIRANTHUS <i>Cberi</i> . Sp. 2. fol. 924. Levcojum luteum, magno flore, cum varietatibus, extus aut intus ferrugi- neis aliisque.	-	-	4
22 CHEIRANTHUS <i>Chius</i> . Sp. 3. fol. 924. Levcojum Tlaspeos facie.	-	-	4

Nro

10 Sommer - Kraut.

11 Großer Erdbeer - Spinat.

12 Gemeine gelbe Ringelblume.

13 Kleine weiße Ringelblume

14 Weiße kleine Ringelblume mit glattem Stängel.

15 Spanischer Pfeffer mit vielen Abartungen von gelben und rothen Schotten.

16 Herzerbse mit glatten Blättern.

17 Großer wilder Safran.

18 Der Hahnenkamp von mannigfaltigen Farben.

19 Das kleine Tausendguldenkraut mit kleinen blau violetten Blümchen.

20 Kornblume von vielen Abartungen.

21 Großer gelber Weil mit mancherley schönen Farben.

22 Mauer Weil mit blauen Blumen.

Nro ⑥

	quint.	fl.	lt.
23 CHEIRANTHUS <i>fenestralis</i> . Sp. 5. fol. 924. Cheiranthus pumilla.	-	-	4
24 CHEIRANTHUS <i>incanus</i> . Sp. 6. fol. 925. Levcoyum incanum majus multiplex, flore rubro, coccineo, albo aut va- riegato.	-	-	5
25 CHEIRANTHUS <i>annuus</i> . Sp. 7. Levcoyum annuum multiplex flore ru- bro, coccineo, albo, violaceo, incar- nato, rubro aut variegato.	-	-	3
26 CHEIRANTHUS <i>viridis</i> . Levcoyum album odoratissimum folio viridi, pleno flore, violaceo & rubro.	-	-	5
27 CHENOPODIUM <i>ambrosioides</i> . Sp. 10. fol. 320. Podrys ambrosiana.	-	-	2
28 CHENOPODIUM <i>scoparia</i> . Sp. 16. fol. 321. vulgo Belvedere.	-	-	2
29 CHRYSANTHEMUM <i>coronarum</i> flore al- bo & luteo pleno. Sp. 16. fol. 1254. Chrysanthemum majus, folio profun- dus laciniato magno flore.	-	-	4
30 CICER <i>arietinum</i> . Sp. 1. fol. 1040. Lotus tedragonolatus.	-	-	3
31 COIX <i>Lacryma Jobi</i> Sp. 1. fol. 1378. Lacryma Jobi vulgo ovapiscium.	-	-	4
32 COMMELINA <i>Communis</i> . Sp. 1. fol. 60.	-	-	3
33 CONVULVULUS <i>purpureus</i> . Sp. 9. fol. 219. Convolvulus major.	-	-	3



Nro

- 23 Zwerg - Levconen von mehreren Farben.
- 24 Winter - Levconen von vielen Farben und Abartungen.
- 25 Sommer - Levconen von mannigfaltigen Farben und Gestalten.
- 26 Wohlriechender Sommer-Seeveil mit grünen Blättern, weiß, roth und blauen Blumen.
- 27 Das wohlriechende Ambrosienkraut.
- 28 Besenkraut, Sommer - Enpressen.
- 29 Kretis, Goldblume mit weiß und gelb gefüllten Blumen.
- 30 Spargelerbsen, Richererbsen.
- 31 Hiobs Thränen.
- 32 Gemeine Commelina aus Amerika.
- 33 Große kriechende Winde mit großen rothen weiblauen Blumen.

34 Zwerg

Nro ⑥

	quint.	fl.	fr.
34 CONVULVULUS <i>tricolor</i> flore albo & cœruleo. Sp. 35. Convolvulus peregrinus folio oblongo procumbens.	-	-	5
35 CREPIS <i>barbata</i> . Sp. 3. fol. 1131. Oculus Christi.	-	-	5
36 DATURA <i>fastuosa</i> flore pleno. Sp. 5. β * fol. 256. Stramonium fructu spinoso rotundo flore cœruleo duplici triplicive.	-	-	8
37 DATURA <i>metel</i> . Sp. 4. * Datura alba.	-	-	5
38 DELPHINIUM <i>consolida</i> . Sp. 1. fol. 748. Consolidaregalis arvensis.	-	-	4
39 DIANTHUS <i>Chinensis</i> multiplicicolore.	-	-	6
40 DOLICHOS <i>Sinensis</i> . Sp. 1. fol. 1018. * Dolichos Sinensis.	-	-	8
41 DOLICHOS <i>Lablab</i> flore albo, violaceo & coccineo. Sp. 2. Phaseolus ægyptius nigro femine.	-	-	5
42 DRACOCEPHALUM <i>moldavica</i> flore cœruleo & albo. Sp. 9. fol. 830. Melissa moldavica.	-	-	3
43 GNAPHALIUM <i>fœtidum</i> . Sp. 26. fol. 1197. * Gnaphalium africanum latifolium fœtidum, Capitulo argenteo vel aureo.	-	-	5
44 GNAPHALIUM <i>undulatum</i> . Sp. 27. Elichrysum grave olens acutifolium caule alato.	-	-	5

34 Zwergrinde mit weißen und blauen Blumen.

35 Das Rindsaug mit gelben und weißen Blumen.

36 Der blau gefüllte Stechapfel.

37 Der weiße Stechapfel.

38 Rittersporn von vielen schönen Farben.

39 Karthäuser Nelken von vielen und schönsten Farben.

40 Chinesische lange Bohne, deren Schotten über 2 Schuhe lang werden.

41 Die Lablab - Bohne hochwachsend von mancherlen Farben, schwarzem Kern, und weißen Strichen.

42 Türkische Melisse mit weißen und blauen Blumen.

43 Stinkendes Boxkraut.

44 Stinkende Sonnen - Goldblume mit spitzigem Blatt, und gefiederten Stängel und weißen Blumen.

Nro 6

45	GOMPHRENA globosa Capitulis albis, cœruleis & variegatis. Sp. 1. fol. 326. Flos globosus vulgo Amaranthus globosus.	-	-	4
46	HELIANTHUS annuus variis speciebus. Sp. 1. fol. 1276. Flos Solis. Helenium Indicum maximum.	-	-	3
47	HIBISCUS manihot Sp. 17. fol. 980. Ketmia folio manihot serrato, flore amplo sulphureo.	-	-	6
48	HIBISCUS abelmoschus. Sp. 18. Alcea hirsuta flore flavo, semine moschato.	-	-	4
49	HIBISCUS trionum. Sp. 25. Ilibiscus alcea minor.	-	-	3
50	IBERIS umbellata. Sp. 7. fol. 906. Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio.	-	-	4
51	IMPATIENS Balsamina. Sp. 5. fol. 1328. * Balsamina flore pleno.	-	-	6
52	IMPATIENS noli me tangere. Sp. 7. Balsamina noli me tangere. Balsamina pudica.	-	-	6
53*	IPOMEA quamoclit. Sp. 1. fol. 227. Convolvulus pennatus exoticus rarior. Jasminum mille folii folio.	-	-	6
54	IPOMEA coccinea. Sp. 6. Convolvulus coccineus folio anguloso, flore coccineo minimo.	-	-	8
55	KNAUTIA orientalis. Sp. 1. fol. 146. Scabiosa orientalis Cariophylli flore purpureo.	-	-	5



Nro

45 Der kugelförmige Tausendschön von mehreren Farben.

46 Die jährliche Sonnenblume.

47 Alcea die hohe mit blaßgelben großen Retsmia-Blumen und Melonen-Blatt.

48 Abelmosch oder Bisamsaamen-Staude, oder die haarige amerikanische Retsmia mit gelben Blumen.

49 Kriechender Hibiscus mit gelben Blumen.

50 Sommer - Thlaspis mit ihren Abartungen und mancherlen Farben.

51 Gefüllte oder Garten - Balsamine.

52 Gelbe Balsamine, Springkörne, oder Rühr mich nicht an, genannt.

53 Quamoclit mit schmalen, eingeschnittenen, gefiederten Blättern.


54 Amerikanisches Quamoclit mit Epheu-Blatt und scharlachrother Blume. Die scharlachrothe Winde.

55 Knautia mit spizigen Blättern und hellrothen Blumen.

56 Wohl

Nro ☉

	gaut.	fl.	fr.
56 LATHYRUS odoratus Sp. 10. fol. 1032.	-	-	3
57 LATHYRUS ficulus. α. magno & peramœno flore odorato.	-	-	5
58 LATHYRUS Zeylanicus. β. Lathyrus odorato flore amœno ex albo & rubro vario.	-	-	5
59 LAVATERA trimestris. Sp. 9. fol. 974. Malva folio vario.	-	-	4
60 LAVATERA trimestris. flore albo. β.	-	-	5
61 LUPINUS albus. Sp. 2. fol. 1015. Lupinus Sativus flore albo.	-	-	2
62 LUPINUS varius. Sp. 3. Lupinus sylvestris flore cœruleo.	-	-	4
63 MALVA peruviana. Sp. 6. fol. 968.	-	-	3
64 MALVA Caroliniana. Sp. 10. Abutilon Carolinianum repens, alceæ foliis gilvo flore.	-	-	3
65 MALVA mauritiana. Sp. 14. Malva hederaceo folio.	-	-	4
66 MARTYNIA annua. Sp. 2. fol. 862. *Martynia annua villosa & viscosa, fo- lio subrotundo flore magno rubro.	-	-	6
67 MEDICAGO scutellata. Sp. 9. β fol. 1097. Trifolium cochleatum fructu latiore.	-	-	5
68 MEDICAGO tornata. Sp. 9. γ Trifolium major & minor levis.	-	-	4
69 MEDICAGO intertexta. Sp. 9. ε. Medicago echinata spinosa, echinis magnis utrimque turbinatis cum spi- nulis reflexis.	-	-	3



Wrd

- 56 Wohlriechende spanische Wicke mit rothen und blauen Blumen.
- 57 Breitblättrige Blattererbsen mit schönen großen gelben Blumen.
- 58 Blattererbsen aus England mit schönen wohlriechenden weiß und roth gestreiften Blumen.
- 59 Sommer-Pappelrosen mit rosenrothen Blumen.
- 60 Sommer-Pappelrosen mit weißen Blumen.
- 61 Weiße Wolfsbohne.
- 62 Blaue und rothe Wolfsbohne.
- 63 Agyptische Eisenkraut, Pappel mit einem Storchschnabel-Blatt, mit kleinen blaß blauen Blumen.
- 64 Kriechende Carolinische Pappeln mit kleinen weißen Blumen.
- 65 Mauritanische Pappeln mit einem Epheu-Blatt.
- 66 Der Elefantenschlüssel, der Adlerkopf, vulgo *Proboscithea cornucea*.
- 67 Blatter Schneckenflee.
- 68 länglicher Schneckenflee.
- 69 Stachelichter Schneckenflee, mit seinen vielerley Abartungen, insgemein der Igelklee genannt.

Nro ☉

	quint.	fl.	te.
70 MOMORDICA <i>Balsamina</i> . Sp. 1. fol. 1433. *Balsamina rotundifolia repens five mas.	-	-	4
71 MOMORDICA <i>charantia</i> . Sp. 2. *Balsamina cucumerina Indica fructu majore flavescente.	-	-	6
72 *MOMORDICA <i>luffa</i> . Sp. 4. Cucumis ægyptius recticaulatus five luffa arabum.	-	-	8
73 MOMORDICA <i>Elaterium</i> . Sp. 8. Cucumis sylvestris dictus asininus.	-	-	4
74 NIGELLA <i>sativa</i> . Sp. 2. fol. 753. Nigella flore minore pleno & albo.	-	-	4
75 NIGELLA <i>arvensis</i> . Sp. 3. Nigella arvensis cornuta.	-	-	4
76 NOLANA <i>prostrata</i> . Sp. 1. fol. 202.	-	-	4
77 OCYUM <i>Basilicum</i> . Sp. 3. fol. 833. Basilicum vulgare.	-	-	3
78 OCYUM <i>Cariophyllum</i> maximum. β.	-	-	4
79 OCYUM <i>Cariophyllum</i> latifolium ma- culatum γ five Crispum.	-	-	5
80 OCYUM <i>Caryophyllum</i> viride foliis bullatis. δ	-	-	4
81 OCYUM <i>minimum</i> . Sp. 4. Ocymum foliis ovatis incanis.	-	-	4
82 ORIGANUM <i>Majorana</i> . Sp. 11. fol. 825. Majorana hortensis odorata.	-	-	2
83 PAPAVER <i>Rhæas erraticum</i> flore pleno β Papaver Rhæas multiplici.	-	-	3
84 PAPAVER <i>somniferum</i> flore pleno β fol. 726. Papaver multiplici colore.	-	-	2

70 Balsamapfel.

71 Balsamapfel aus Ceylon mit Weinblatt, und
langen stachelichten rothen Früchten.

72 Arabische lange Luffa, oder Agyptische Cucu-
mern.

73 Wilde Cucumern, Esels-Cucumern, Spring-
oder Mexier-Cucumern.

74 Arabischer Dill, wohlriechender Schwarz-
kümmel.

75 Gehörner schwarzer Feldkümmel mit kleinen
blaßblauen Blumen.

76 Agyptischer Nachtschatten.

77 Basilien, Basilicum, von diesen giebt es gar
viele Abartungen.

78 Basilicum mit den größten Blättern.

79 Basilicum mit großen schwarz und grün ge-
heckten Blättern.

80 Basilicum mit großen grünen aufgeblasenen
Blättern.

81 Das ganz kleine Basilicum mit sehr kleinen
gefrausten Blättern.


82 Gemeiner oder wohlriechender Gartenmayo-
ran.

83 Der kleine gefüllte Olmagen, die kleine Kla-
pperose von sehr vielen Farben.

84 Großer Olmagen von unzähligen gefüllten
Blumen.

Nro 6

		quint.	fl.	te.
85	PENTA <i>peres phœnicea</i> . Sp. 1. fol. 958. Alcea Indica, lucido hastato folio flore blattariæ phœniceo.	-	-	10
86	PHALARIS <i>Canariensis</i> . Sp. 1. fol. 79. Phalaris radice annua.	-	-	2
87	PHASEOLUS <i>coccineus</i> . Sp. β. fol. 1016. Phaseolus puniceo flore.	-	-	2
88	PHYSALIS <i>pubescens</i> . Sp. 8. fol. 262. Solanum vesicarium virginianum procumbens annuum folio lanuginoso.	-	-	4
89	POLYGONUM <i>orientale</i> . Sp. 12. fol. 519. Persicaria foliis ovato lanceolatis, acutis, foliis pentandris caule erecto Mül.	-	-	2
90	RESEDA <i>odorata</i> . Sp. 11. fol. 646. Reseda foliis integris, floribus odoratis.	-	-	3
91	RICINUS <i>communis</i> . Sp. 1. fol. 1430. Ricinus albus.	-	-	3
92	RICINUS <i>communis</i> totus ruber. Sp. β. Ricinus africanus maximus, caule geniculato rubricante.	-	-	5
93	SALVIA <i>dominica</i> . Sp. 13. fol. 35.	-	-	4
94	SATUREJA <i>bortensis</i> . Sp. 6. fol. 795. Thymus erectus annuus foliis lanceolato-linearibus.	-	-	1
95	SCABIOSA <i>stellata</i> . Sp. 15. fol. 144. Scabiosa major hispanica.	-	-	2
96	SCABIOSA <i>atro-purpurea</i> . Sp. 17. Scabiosa peregrina rubra capite oblongo.	-	-	3



Nro

- 85 Indianisches Mutterkraut.
- 86 Canariengras mit weißen Säamen.
- 87 Türkische Phaseolen mit rothen Blumen, in Pyramiden-förmigen Ähren wachsend mit schwarz und roth gedüpten Bohnen.
- 88 Kleine virginische Judenfirsche.
- 89 Großer Baum - Amaranth, Beeren tragender Amaranth.
- 90 Wohlriechendes Hornkraut, Nachtsviole.
- 91 Gemeiner Wunderbaum, oder der weiße Ricinus.
- 92 Der rothe staudenartige Wunderbaum.
- 93 Die große breitblättrige Salben von der Insel Dominique mit blauen Blumen.
- 94 Das Bohnenkraut oder Saturay.
- 95 Stern - Scabiosen.
- 96 Braunrothe Scabiosen, Apostemkraut.

Nro ☉

	quint.	q.	fr.
97 SCORPIURUS <i>vermiculata</i> . Sp. 1. fol. 1050. Scorpioides folliqua crassa boelli.	-	-	6
98 SENECIO <i>elegans</i> . Sp. 19. fol. 1218. Alter africanus annuus Senecionis foliis, vulgo Jacobea capensis flore purpurea & alba.	-	-	4
99 SENECIO <i>elegans</i> flore pleno β. Jacobea africana frutescens flore amplo purpureo elegantissimo Senecionis folio. β.	-	-	6
100 SIDA <i>abutylon</i> . Sp. 16. fol. 963. Althæa Theophrasti colore luteo.	-	-	3
101 SIDA <i>christata</i> . Sp. 3. Abutilon lavateræ re fructu christato.	-	-	2
102 SOLANUM <i>Melongena</i> . Sp. 16. fol. 266. Mala insana.	-	-	5
103 SOLANUM <i>Virginianum</i> Sp. 21. Solanum annuum Virginianum nigricans spinosissimum flore cœruleo.	-	-	5
104 TAGETES <i>patula</i> . Sp. 1. fol. 1249. Flos africanus minor β. Tagetes Indicus minor multiplicato flore.	-	-	3
105 TAGETES <i>erecta</i> . Sp. 2. Tagetes mexicanus alter polyanthos. Tagetes fistuloso flore pleno. S.	-	-	3
106 TRIFOLIUM <i>melilotus</i> cœruleo. Sp. 1. fol. 1077. Lotus hortensis odorata.	-	-	2



Nro

97 Raupenflee.

98 Jacobs Blume, Jacobea genannt, die weiße und blaue.

99 Jacobea die gefüllte weiße und blaue.

100 Indianische Pappeln mit großen Pappelblättern, sehr haarigen Stängeln, und kleinen gelben Blumen.

101 Kleine niedrige Pappeln mit Betonienblatt, violeten Blumen und rauhen Saamen.

102 Tollapfel, das Eneergewächs mit gelben und blauen Früchten.

103 Rother jähriger virginischer Nachtschatten, welcher die meisten Dornen hat, mit blauer glatter Blume.

104 Kleine Sammetblume africana, die kleine türkische Rose.

105 Große Sammetblume, die große türkische gelbe Rose africana.

106 Das Siebengezeit oder Steinflee mit blauen Blumen.

Nro ☉

		grains	℥.	lb.
107	TRIGONELLA <i>fœnum græcum</i> Sp. 9. fol. 1095. Fœnum græcum Sativum.	-	-	4
108	TROPÆOLUM <i>majus</i> . Sp. 2. fol. 490. Cardamindum majus.	-	-	3
109	URTICA <i>pilulifera</i> . Sp. 1. fol. 1395. Urtica Romana.	-	-	2
110	VIOLA <i>tricolor</i> . Sp. 15. fol. 1326. Jacea sive flos trinitatis. β	-	-	2
111	XERANTHEMUM <i>annuum</i> . Sp. 1. fol. 1201. flore albo & cœruleo. Ptarmica austriaca.	-	-	3
112	ZINNIA <i>pauciflora</i> . Sp. 1. fol. 1269. Bidens calice oblongo feminibus radii corolla non decidua coronatis Mül.	-	-	3
113	ZINNIA <i>multiflora</i> . Sp. 2. Bidens calice floribus numerosis.	-	-	4





Nro

107 Trigonelle, oder Bockshorn genannt.

108 Große türkische Blumenkreze.

109 Römische stark brennende Kugelnessel.

110 Drenfastigkeits - Blümlein von mannigfaltigen Farben.

111 Papierblume mit weißen und blauen Blumen.

112 Die gelbe Zinnia.

113 Die rothe Zinnia.



Zweytes

Perennirende, oder
deren Laub und Zweige Winters vergehen,


Nro V

	Q.	fl.	lr.
1 ACONITUM licoctonum. Sp. 1. fol. 750. Aconitum licoctonum luteum luparia vulgo.	-	-	8
2 ACONITUM Napellus. Sp. 4. Napellus vernus flore cœruleo.	-	-	6
3 ACONITUM Pyrenaicum. Sp. 5. Aconitum Pyrenaicum luteum foliorum segmentis sibi invicem incumbenti- bus.	-	-	8
4 ACONITUM Cammarum. Sp. 6. Aconitum violaceum sive Napellus.	-	-	8
5 ACONITUM Cammarum flore albo. β.	-	-	10
6 ACONITUM Anthora. Sp. 7. Aconitum salutiferum vulgo anthora.	-	-	10
7 ACHILLEA ageratum Sp. 2. fol. 1264. Ageratum foliis seratis, Balsamita mi- nor.	-	-	15
8 ACHILLEA ptarmica flore pleno. β Ptarmica vulgaris flore pleno. β.	-	-	12
9 ACHILLEA Millefolium. Sp. 18. Millefolium purpureum majus. β.	-	-	12




Verzeichniß.

mehrere Jahre dauernde Gewächse,
und im Frühjahre in frische treiben.



Nro 1

1 Gelbe giftige Wolfswurz.

2 Blaues Eisenhütlein, Sturmhut, Giftblume.

3 Pyrenäische Wolfswurz mit gelben Blumen.

4 Wolfswurz mit fünf griflichter Blüthe und
blauen Blumen.

5 Wolfswurz mit weißen Blumen.

6 Giftheil mit vierfachen fleischigten Knollen,
Gegengift.

7 Leberbalsam, kleiner Gartencostus.

8 Weißer Dorant, Wiesenbertram, oder Do-
rant mit vollen Blumen.

9 Große Schafgarbe mit purpurrothen Bluo-
men.

10 Ado,

Nro V

	Sp.	fl.	fr.
10 <i>ADONIS vernalis</i> . Sp. 3. fol. 771. Adonis radice perenni. Helleborus niger tenuifolius. Buphtalmi flore.	-	-	15
11 <i>AGROSTEMA coronaria</i> flore pleno. Sp. B. fol. 625. Lychnis coronaria dioscoridis fativa flore pleno. B.	-	-	12
12 <i>ALCEA rosea</i> variis speciebus. Sp. 1. fol. 966. Malva rosea folio subrotundo flore multiplici pleno.	-	-	4
13 <i>ALCEA ficifolia</i> . Sp. 2. Malva rosea folio ficus.	-	-	4
14 <i>ANTIRRHINUM bicornis</i> . Sp. 25. fol. 856. Antirrhinum foliis copiosis oblongis dentatis, capsula corniculata reflexa.	-	-	4
15 <i>ANTIRRHINUM majus</i> . Sp. 35. Antirrhinum majus rotundiore folio α . Antirrhinum luteo flore β .	-	-	4
16 <i>ANTHEMIS nobilis</i> . Sp. 7. fol. 1260. Matricaria receptaculis conicis radiis reflexis seminibus nudis, squamis ca- lycinis margine aequalibus.	-	-	5
17 <i>ANNEMONE hepatica</i> flore cœruleo & rubro. Sp. 1. fol. 758. Hepatica nobilis flore pleno cœruleo & rubro.	-	-	6
18 <i>ANNEMONE nemorosa</i> . Sp. 15. Annemone nemorosa flore pleno. Annemonoides flore pleno albo vel purpureo.	-	-	5



Nro

10 Adonis mit Nießwurz - Stängeln; und großen gelben glänzenden Blumen.

11 Marienröslein mit gefüllten Blumen.

12 Gartenpappeln, Rosenpappeln, Stockrosen von unzählbaren Abartungen mit gefüllten Blumen.

13 Gartenpappeln mit gefingerten oder Feigenblättern.

14 Antirrhinum, Kalbsnase, mit rothen Blumen.

15 Breitblättriger Granat mit rothen und weißen, oder rothen und gelben Blumen. Löwenmaul.

16 Römische Camillen mit gefüllten Blumen.


17 Leberkraut mit gefüllten blauen und rothen Blumen.

18 Storchblume mit weißen gefüllten und purpurrothen Blumen.

19 Acker

Nro V

	Q	q.	fc.
19 <i>AQUILEGIA hortensis</i> multiplex colore variegata. <i>Sp. 8. fol. 752.</i> <i>Aquilegia vulgaris</i> flore pleno variorum colorum. β .	-	-	6
20 <i>AQUILEGIA vulgaris</i> flore inverso.	-	-	5
21 <i>AQUILEGIA vulgaris</i> flore roseo variorum colorum.	-	-	6
22 <i>ASTER amellus.</i> <i>Sp. 10. fol. 1226.</i> <i>Aster atticus</i> cœruleus vulgaris.	-	-	6
23 <i>ASTER dumosus.</i> <i>Sp. 12.</i> <i>Aster novæ angliae</i> , <i>linariæ</i> foliis <i>chamæmeli</i> floribus.	-	-	7
24 <i>ASTER linifolius.</i> <i>Sp. 16.</i> <i>Aster tripolii</i> flore angustissimo & tenuissimo folio.	-	-	7
25 <i>ASTER concolor.</i> <i>Sp. 18.</i> <i>Aster purpureus</i> non ramosus foliis parvis rigidis, floribus concoloribus feriatim ad caulem dispositis.	-	-	10
26 <i>ASTER novæ angliae.</i> <i>Sp. 21.</i> <i>Aster novæ angliae</i> altissimus hirsutus, floribus amplis purpureo violaceis.	-	-	8
27 <i>ASTER tratescanti.</i> <i>Sp. 29.</i> <i>Aster Virginianus</i> ramosissimus ferotinus, parvis floribus albis <i>tratescanti</i> .	-	-	12
28 <i>BELLIS hortensis</i> flore pleno. <i>Sp. 1. β fol. 1249.</i>	-	-	5
29 <i>BELLIS rubra</i> multiplici fistulosa <i>Sp. 1. γ</i> <i>Bellis hortensis</i> prolifera, flore multiplici fistulosa.	-	-	5
30 <i>CAMPANULA persicifolia</i> flore albo pleno. <i>Sp. 6. fol. 232.</i>	-	-	8




Nro

- 19 Aefelen mit gefüllten Blumen von mancherley Farben.
- 20 Aefelen, deren Blumenblätter und Höniggefäße zum Theile gegeneinander stehen.
- 21 Sternackelen von allerhand Farben.
- 22 Gemeine blaue Aſter, niederes Berg-Aſternkraut.
- 23 Spätes Sternkraut aus Neuengland, mit sehr feinen und schmalen Blättern, und kleinen perlenblauen Blumen.
- 24 Schmalblättriges Sternkraut mit niedrigen Stängeln und kleinen blaulichten Blumen.
- 25 Veränderliche Sternblume von niedrigen Stängeln, kleinen Blättern und kleinen Blumen.
- 26 Hohe rauhe spät blühende Sternkrautstaude aus Neuengland mit großen purpurfarbigen Blumen, ist die schönste und höchste Art.
- 27 Staudiges spät blühendes Sternkraut mit blauen Blumen.
- 28 Garten-Maßlieben mit gefüllten Blumen, roth und weiß gestreift.
- 29 Rothe gefüllte Garten-Maßlieben mit fistulösen Blättern.
- 30 Wald-Glockenblume, mit Pferſing-Laube, und weißen gefüllten Blumen.

31 Wald-

Nro V

		Q	fl.	fr.
31	CAMPANULA <i>persicifolia</i> flore cœruleo pleno. Sp. β.	-	-	8
32	CAMPANULA <i>pyramidalis</i> . Sp. 7. Campanula latiore folio vulgo pyramidalis.	-	-	12
33	CAMPANULA <i>glomerata</i> . Sp. 17. Campanula pratensis flore conglomerato.	-	-	3
34	CAMPANULA <i>Trachelium</i> flore duplici vel multiplici. Sp. 16.	-	-	9
35	CAMPANULA <i>latifolia</i> . Sp. 11. Campanula maxima foliis latissimis.	-	-	10
36	CASSIA <i>Merilandica</i> . Sp. 20. fol. 541. Cassia Mimosa foliis, filiqua hirsuta, vulgo Cassia memosoides.	-	-	15
37	CENTAUREA <i>glastifolia</i> . Sp. 33. fol. 1294. Centaurea majus orientale, erectum glastifolio.	-	-	10
38	CHELIDONIUM <i>glaucum</i> . Sp. 2. fol. 724. Papaver corniculatum luteum.	-	-	12
39	CHRYSOCEMA <i>linosyris</i> . Sp. 6. fol. 1178. Linosyris nupèrorum.	-	-	10
40	CLEMATIS <i>recta</i> . Sp. 11. fol. 767. Flamula recta.	-	-	13
41	CLEMATIS <i>integrifolia</i> . Sp. 12. Clematis cœrulea pannonica minor.	-	-	15
42	CONVALARIA <i>majalis</i> flore albo & rubro pleno. Sp. 1. fol. 451. Lilium Convallium album. α.	-	-	6
43	Lilium Convallium angustifolium flore rubro. β.	-	-	15



Nord

- 31 Wald - Glockenblume mit gefüllten blauen Blumen.
- 32 Pyramidenförmige hochwachsende Glockenblume mit blauen Blumen.
- 33 Buschel - Glockenblume mit schönen blauen Blumen.
- 34 Gemeine große rauhe Waldglocke, mit Rieselfläthern und gefüllten Blumen.
- 35 Große hochstänglichte und breitblättrige Glockenblume, die Riesenglocke.
- 36 Morgenländischer Cassienstrauch mit gelber Blume.
- 37 Morgenländische gelbe Bisamknopf, die gelbe Bisamblume, mit breiten großen Blättern.
- 38 Gelber Herzmohn, dessen Blumen gelb glänzenden Farbe den Mohnblumen gleichen.
- 39 Deutsches Goldhaar.
- 40 Aufrecht wachsende Waldrebe mit weißen in Büscheln wachsenden Blumen.
- 41 Niedrige aufrecht stehende Waldrebe mit blauen Blumen.
- 42 Weiße gemeine Mayenblume, wovon es folgende Abartungen giebt.
- 43 Rote Mayenblumen.

Nro V

	Q	fl.	fc.
44 LILIUM Convallium latifolium flore pleno. ♂.	-	-	20
45 COREOPS <i>stripteris</i> . Sp. 9. fol. 1282. Chrysanthemum virginianum folio acutiore levi, trifoliato sive anagyridis folio.	-	-	15
46 DELPHINIUM <i>elatum</i> . Sp. 6. fol. 749. Aconitum cœruleum hirsutum flore consolidæ regalis.	-	-	18
47 DIANTHUS <i>barbatus</i> . Sp. 1. fol. 586. Cariophyllus hortensis barbatus flore pleno.	-	-	3
48 DIANTHUS <i>Carthusianorum</i> flore pleno. Sp. 2. Cariophyllus arvensis caliculo florum numerofo.	-	-	3
49 DIANTHUS <i>Cariophyllus</i> . Sp. 6. Cariophyllus hortensis flore pleno multiplici.	-	-	10
50 DIANTHUS <i>Cariophyllus imbricatus</i> . α. Cariophyllus spicum frumenti refrens. β.	-	-	20
51 DIANTHUS <i>glaucus</i> . Sp. 8. Tunica ramufior, flore candido cum corolla purpurea.	-	-	8
52 DIANTHUS <i>Chinensis</i> . Sp. 9. Cariophyllus chinensis, fupinus leuco folio, flore unico.	-	-	8
53 DIANTHUS <i>plumarius</i> . Sp. 12. Cariophyllus fylveftris, floribus lanugiofis hirsutis.	-	-	5
54 DICTAMUS <i>albus</i> . Sp. 1. fol. 548. Fraximella flore purpureo major.	-	-	12



Nro

- 44 Gefüllte Mayblumen.
- 45 Hohe virginische unächte Goldruthenstaude.
- 46 Hoher staudiger beständiger und haarichter
Bergrittersporn mit blauen Blumen.
- 47 Gefüllte Buschnelke, oder Bardnelke, von
unzählbaren Farben.
- 48 Gefüllte Carthäusernelke von vielen schönen
Farben.
- 49 Gemeine Gartennägelein von unzählbaren
Farben und Gestalten.
- 50 Gartennägelein mit Korn - oder Weizen-
ähren.
- 51 Bergnägelein mit weißer Blume, so einen
purpurrothen Kreis hat.
- 52 Einfache und gefüllte Chinesernelke von vie-
len schönen Farben.
- 53 Gefüllte Federnelke, Pfingstnelke.
- 54 Weiße Diptamwurzel, mit purpurfarbigen
Blumen.

Nro V

	Q	fl.	fr.
55 DIGITALIS <i>purpurea</i> . Sp. 1. fol. 866. Digitalis purpurea folio aspero cum suis varietatibus.	-	-	4
56 DIGITALIS <i>lutea</i> . Sp. 2. Digitalis lutea minore flore.	-	-	3
57 DIGITALIS <i>ferruginea</i> . Sp. 3. Digitalis latifolia, flore ferrugineo.	-	-	12
58 DIGITALIS <i>magna lutea glabra</i> . Gledt. Digitalis lutea magno flore.	-	-	12
59 DORONICUM <i>plantagineum</i> . Sp. 2. fol. 1247. Doronicum minus officinarum.	-	-	8
60 ECHINOPS <i>sphærocephalus</i> . Sp. 1. fol. 1314. Cardus sphærocephalus latifolius vul- garis.	-	-	12
61 EPILOBIUM <i>angustifolium</i> . Sp. 1. fol. 493. Lysimachia chamænerion dicta angu- stifolia.	-	-	10
62 EUPHORBIA <i>lathyris</i> . Sp. 36 fol. 655. Lathyrus major.	-	-	8
63 GENTIANA <i>verna</i> . Sp. 10. fol. 331. Gentiana alpina, magno flore.	-	-	12
64 GERANIUM <i>macrorrhizum</i> . Sp. 36. fol. 953. Geranium batrachioides longius radi- catum odoratum.	-	-	10
65 GERANIUM <i>sanguineum</i> . Sp. 56. Geranium sanguineum, maximo flore violaceum.	-	-	10
66 GNAPHALIUM <i>margaritaceum</i> . Sp. 33. fol. 1198. Gnaphalium americanum latifolium.	-	-	12

Nro

- 55 Purpurfärbige, weiße oder röthlichte Fingerhutblume.
- 56 Fingerhutblume mit kleinen blaßgelben Blumen.
- 57 Breitblättriger Fingerhut mit eisenfärbigen Blumen.
- 58 Fingerhut mit großen gelben Blumen.
- 59 Gemswurz mit dem Wegerichblatt.
- 60 Große lichtblaue Kugeldistel.
- 61 Bergschotten - Weidrig mit langen Blumen-
spitzen.
- 62 Breitblättrige Wolfsmilch, Cataputia genakit
mit kleinen gelb - grünfärbigen Blumen.
- 63 Früher Alpenentian, mit großen blauen Blumen.
- 64 Langwurzlichter wohlriechender Storchschna-
bel mit Froschpfoten - Blättern.
- 65 Blutwurz, der großblumige Berg - Storch-
schnabel, mit rauhen fünftheiligten Blät-
tern, und drenzackigen Einschnitten.
- 66 Große breit - und spißblättrige Kleinblumen-
staude, mit perlenfarben Blumenknöpfen.

Nro V

	Q	l.	fr.
67 HEDYSARUM <i>canadense</i> . Sp. 20. fol. 1054. Hedysarum triphyllum canadense.	-	-	5
68 HEDYSARUM <i>coronarium</i> . Sp. 37. Hedysarum clypeatum floribus purpureis vel candidis.	-	-	8
69 HELENIMUM <i>autumnale</i> . Sp. 1. fol. 1248. Aster floridanus aureus, caule alato, flore luteo.	-	-	6
70 HELLEBORUS <i>niger</i> . Sp. 2. fol. 783. Helleborus niger flore roseo.	-	-	16
71 HELLEBORUS <i>fœtidus</i> . Sp. 4. Helleborus niger fœtidus. Helleborus maximus. α.	-	-	8
72 HELIANTHUS <i>multiflorus</i> . Sp. 2. fol. 1277. Corona solis minor perennis flore pleno, vulgo flos solis perennis.	-	-	5
73 HESPERIS <i>matronalis</i> flore albo & cœruleo pleno. Sp. 2. fol. 927. Viola matronalis flore albo aut purpureo pleno.	-	-	12
74 HIRACIUM <i>aurantiacum</i> . Sp. 9. fol. 1126. Hiracium hortense, floribus atropurpureascentibus.	-	-	10
75 INULA <i>ensifolia</i> . Sp. 15. fol. 1240. Aster luteus linariæ rigido glabro folio.	-	-	10
76 LATHYRUS <i>latifolius</i> . Sp. 18. fol. 1033. Lathyrus major latifolius, flore purpureo speciosior.	-	-	8
77 LOTUS <i>maritimus</i> . Sp. 1. fol. 1089. Lotus tetragonolobus maritimus flore luteo.	-	-	9



Nro

- 67 Hoher staudiger canadischer Schildklee, oder Canadischer Klee mit rothen Blumen.
- 68 Spanischer großer Schildklee mit purpurfarbigen oder weißen Blumen.
- 69 Amerikanischer unächter hoher Alantstrauch.
- 70 Wahre schwarze Nieswurz, steinermärkische Nieswurz.
- 71 Stinkende schwarze Nieswurz.
- 72 Gemeine kleine gefüllte Sonnenblumen-Staude, oder die immer bleibende Sonnenblume.
- 73 Gartenviole, oder Muscatenblume, oder Matronal mit weißen und rothen gefüllten Blumen.
- 74 Garten-Habichtkraut mit dunkel purpurrothen Blumen.
- 75 Gelber Alant, Sternkraut mit ganz schmalen phrimenförmigen Blättern.
- 76 Große gemeine beständige breitblättrige Blattererbse mit purpurrothen Blumen.
- 77 Schotten tragender gelber See-Steinklee mit glattem Blatt und gelben Blumen.

Nro V

		Q.	R.	tr.
78	LUNARIA <i>rediviva</i> flore albo & coeruleo. Sp. 1. fol. 911. Lunaria major, filiqua oblonga.	-	-	5
79	LUNARIA <i>biennis</i> . Gledt. Lunaria major, filiqua rotundiore.	-	-	6
80	LYCHNIS <i>chalcidonica</i> flore coccinea carneo & albo. Sp. 1. fol. 625. Lychnis hirsuta flore coccineo major. Flos Constantinopolitanus.	-	-	2
81	LYCHNIS <i>chalcidonica</i> flore coccineo plenissimo. β .	-	-	15
82	LYCHNIS <i>flascuuli</i> . Sp. 2. flore pleno. β Caryophyllus pratensis flore pleno.	-	-	15
83	LYCHNIS <i>viscosa</i> . Sp. 3. Lychnis viscosa sylvestris angustifolio flore pleno.	-	-	15
84	LYSIMACHIA <i>vulgaris</i> Sp. 1. fol. 209. Lysimachia germanica flore luteo	-	-	12
85	MATRICARIA <i>parthanium</i> flore pleno. Sp. 1. fol. 1255. Matricaria vulgaris, sive fativa flore pleno, floribus fistulosis. Matricaria flore pleno.	-	-	4
86	MIRABILIS <i>Falapa</i> , Sp. 1. fol. 252. Admirabilis peruviana, vulgo Flos admirabilis.	-	-	4
87	MIRABILIS <i>longiflora</i> . Sp. 3. Mirabilis mexicana flore albo.	-	-	5
88	MONARDA <i>fistulosa</i> . Sp. 1. fol. 32. Origanum fistulosum canadense flore coccineo.	-	-	15



- 78 Großes Mondenkraut oder Silberblatt mit langen weißen und blauen Blumen.
- 79 Gemeines rundschätziges Mondenkraut oder Silberblatt mit weißen und blauen Blumen.
- 80 Jerusalems Blume, Ichnis von Constanti-
nopol mit scharlachrothen weißen und fleisch-
färbigen Blumen.
- 81 Scharlachfärbige gefüllte Jerusalems Blu-
me.
- 82 Gefüllte Gaugnelke, Guckucks Blume mit
breiten Blättern.
- 83 Rothe gefüllte Pechnelke mit schmalen Blät-
tern.
- 84 Gelber großer Weiderich mit schönen gelben
Blumen, ist im Deutschland zu Haus.
- 85 Gemeines Mutterkraut mit gefüllten röhrigen
weißen Blumen.
- 86 Peruvianische Wunderblume mit aufgerichtet
stehenden Blumenbüscheln am Ende der
Stängel und vielen Farben, insgemein die
Schweizerrose genannt.
- 87 Langblumigte peruvianische weiße Wunder-
blume Jelapa genannt.
- 88 Das blaue oder porcellanfärbige glatte Mo-
narde, Wirbeldoste.

Nro V

	Q.	fl.	fr.
89 MONARDA <i>didyma</i> . Sp. 2. Monarda caule acute angulato, capitulis terminalibus flore cœruleo.	-	-	10
90 MONARDA <i>chinopodia</i> . Sp. 3. Monarda foliis ovato lanceolatis.	-	-	15
91 OENOTHERA <i>pumila</i> . Sp. 7. fol. 493 Lyfimachia marilandica parva, foliis angustis acutis.	-	-	5
92 OENOTHERA <i>biennis</i> . Sp. 3. Lyfimachia lutea corniculata.	-	-	8
93 OROBUS <i>vernus</i> . Sp. 4. fol. 1028. Orobis sylvaticus purpureus vernus.	-	-	10
94 OROBUS <i>niger</i> . Sp. 7. Orobis sylvaticus viciæ foliis.	-	-	11
95 PAPAVER <i>orientale</i> . Sp. 9. fol. 727. Papaver orientale hirsutissimum flore magno coccineo.	-	-	15
96 PHLOMIS <i>tuberosa</i> . Sp. 8. fol. 819. Phlomis urticæ foliis glabra.	-	-	12
97 PHLOX <i>paniculata</i> . Sp. 1. fol. 216. Lychnidea folio salicino.	-	-	12
98 PHLOX <i>maculata</i> . Sp. 2. Lychnoides marilandica.	-	-	20
99 PHLOX <i>glaberima</i> . Sp. 5. Lychnidea folio Melampyri.	-	-	10
100 PHLOX <i>divaricata</i> . Sp. 6. Lychnidea virginiana albes aquaticæ foliis, floribus in ramulis divaricatis.	-	-	12



Nro

- 89 Hochrothe unächte virginische Wirbeldoste,
scharlachrothe Monarde.
- 90 Die höchste glatte Monarde, mit roth viole-
ten Blumen.
- 91 Gelbes Inſimachienkraut, mit kleinen lanzen-
förmigen Blättern.
- 92 Gelber virginischer Weiderich, gelbe virgini-
sche oder französische Rapunzel.
- 93 Fasanenkraut, die Frühlingserbse, Wald-
Fasanenkraut.
- 94 Hohe glatte Walderbsenstaude.
- 95 Rauhblättriger morgenländischer Mohn mit
den größten purpurrothen Blumen.
- 96 Jerusalems Salbey mit glattem Nesselblatt,
und blaß purpurrothen Blumen.
- 97 Höchste virginische Inchnisstaude oder Fla-
menblume mit Weidenblättern und dunkel-
blauen Blumen.
- 98 Bastard-Inchnis aus Manland mit Blät-
tern, welche einander gegenüber wachsen,
punctirten hohen Stängeln, und rothen vio-
leten Blumen.
- 99 Virginische glänzende Inchnis, niedrige Fla-
menblume mit ganz gespitzten Blättern, dun-
kelblau.
- 100 Niedrige früheste virginische Inchnisstaude,
mit breiten rauhen Wasserhünerdarms-
Blättern, und perlenblauen Blumen.



Nro V

	①	fl.	fr.
101 PRIMULA <i>Veris</i> elatior. β . fol. 204. Primula <i>Veris</i> officinalis odorata.	-	-	5
102 PRIMULA <i>auricola</i> . Sp. 3. vulgo auricula ursi.	-	-	5
103 PHYTOLACCA <i>decandra</i> . Sp. 2. fol. 631. Solanum racemosum americanum.	-	-	4
104 POLEMONIUM cœruleum & album. Sp. 1. fol. 236. Valeriana græca flore cœruleo & albo.	-	-	6
105 PULMONARIA <i>officinalis</i> . Sp. 1. fol. 194. Pulmonaria vulgaris latifolia flore albo β .	-	-	8
106 RANUNCULUS <i>bullatus</i> flore pleno pro- lifero. Sp. 8 fol. 774. Ranunculus latifolius bullatus autum- nalis, flore pleno & prolifero.	-	-	15
107 RANUNCULUS <i>repens</i> hortensis flore pleno. Sp. 25.	-	-	6
108 RANUNCULUS <i>aconitifolia</i> flore albo multiplici. 8. Ranunculus montanus aconitifolio, flo- re albo multiplici.	-	-	12
109 RANUNCULUS <i>bulbosus</i> flore pleno. Sp. 25. Ranunculus pratensis, radice verticil- li modo rotunda.	-	-	15
110 RANUNCULUS <i>lanuginosus</i> . Sp. 29. Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo.	-	-	20
111 RUDEKIA <i>triloba</i> . Sp. 2. fol. 1280. Chrysanthemum cannabinum hirsutum disco magno petulis aureis radiato.	-	-	10



Nro

- 101 Wohlriechende Schlüsselblume von ausnehmenden vielen schönen farbigen Blumen.
- 102 Mausöhrlein, Bärenöhrlein, oder Aurikeln genannt, von unzählbaren schönen Farben.
- 103 Der gemeine Altferrnß.
- 104 Griechischer Baldrian.
- 105 Gemeines Lungenkraut, mit blauen Blumen und gefleckten Blättern.
- 106 Kleiner gelber rundblättriger Hahnenfuß, mit gefüllten Blumen, welcher Blumen auf Blumen machet.
- 107 Gemeiner kriechender Hahnenfuß, mit gelben glänzenden Blumen, gelbe gefüllte Schmalzblümlein.
- 108 Berg - Hahnenfuß mit Wolfswurz - Blättern, und weißen gefüllten Blumen.
- 109 Knollichter Hahnenfuß mit gefüllten blaß gelben Blumen.
- 110 Großer breitblättriger rauher und gelber Hahnenfuß mit Wolfswurzel - Blättern.
- 111 Virginischer Hanf - Ugermenning mit großen Blumenscheiben, und gelben langen Blumenstrahlen.

112 Ume,

Nro V

	Q	n.	fr.
112 <i>RUDBEKIA purpurea</i> . Sp. 4. Dracunculus virginianus latifolius pe- talis florum longissimis purpurascen- tibus.	-	-	30
113 <i>SALVIA officinalis</i> foliis aureis & ar- genteis variegatis. <i>β.</i> Sp. 4. fol. 34.	-	-	3
114 <i>SALVIA major</i> foliis crispis Gledt. Salvia major foliis crispis.	-	-	6
115 <i>SANTOLINA chamae Cyparissus</i> . Sp. 1. fol. 1179. Abrotanum foemina vulgare.	-	-	5
116 <i>SAPONARIA officinalis</i> flore pleno. Sp. 1. <i>β.</i> fol. 584. Saponaria major levis.	-	-	6
117 <i>SAXIFRAGA Cotyledon</i> flore albo. Sp. 8. fol. 570. Cotyledon media foliis oblongis fer- ratis.	-	-	8
118 <i>SAXIFRAGA genm.</i> Sp. 17. Sedum montanum rotundifolium mi- nus album non guttatum.	-	-	10
119 <i>SAXIFRAGA irregularis</i> .	-	-	12
120 <i>SAXIFRAGA Cotyledon major</i> pyrami- dali flore crenato & retuso folio po- lyanthos. <i>ε.</i> Gledt.	-	-	15
121 <i>SAXIFRAGA media</i> . Gledt. Cotyledon media foliis oblongis fer- ratis, lingua anserina dicta.	-	-	12
122 <i>SAXIFRAGA minor</i> . Gledt. Cotyledon minor aut umbilicus Vene- ris dictus.	-	-	51

Nro 110

112 Amerikanische Goldblume mit langen rothen Strahlenblumen, die carolinische Zwerg-Sonnenblume.

113 Salben mit vergoldeten Blättern, Salben mit versilbertem Laube.

114 Große krause und gezackte indianische Salben.

115 Gemeines weißes Cypressenkraut.

116 Wilde Inchniß, das Seifenkraut mit gefüllten Persing-rothen Blumen.

117 Lang- und steifblättriger Steinbrech mit gegerbten dicken Ründen an den Blättern.

118 Rundblättriges Nierenkraut, mit blaßem Blumenstempel.

119

120 Steinbrech mit schmalem Hauswurzelblatt, am Rande sägeförmig gezähnt, mit weißrothen Blumen.

121 Mittelmäßiger steifblättriger Steinbrech mit gegerbten dicken Ründen an den Blättern, Gänsezunge, und mit pyramidenförmigen weißen Blumen.

122 Kleinerer Alpen-Steinbrech, mit kürzern gegerbten dicken Ründen an den Blättern, der gemeine Venusnabel.

123 Stein

Nro V

	Q.	fl.	lt.
123 SAXIFRAGA <i>crassifolia</i> . Sp. 11. Saxifraga foliis ovalibus crenulatis, caulibus nudis.	-	-	20
124 SEDUM <i>Telephium</i> . Sp. 2. fol. 616. Telephium vulgare.	-	-	8
125 SERATULA <i>multiflora</i> . Sp. 5. fol. 1145. Seratula elatior floribus umbellatis par- vis.	-	-	12
126 SPIRÆA <i>filipendula</i> . Sp. 9. fol. 702. Filipendula flore pleno.	-	-	10
127 SPIRÆA <i>ulmaria</i> . Sp. 10. Ulmaria flore pleno. Regina prati.	-	-	10
128 SOLIDAGO <i>canadensis</i> . Sp. 2. fol. 1233. Virga aurea angustifolia, panicula spe- ciosa canadensis.	-	-	8
129 SOLIDAGO <i>cæsia</i> . Sp. 5. Virga aurea cæsia glabra.	-	-	8
130 SOLIDAGO <i>mexicana</i> . Sp. 6. Virga aurea limoniifolio, panicula uno versu disposito.	-	-	10
131 SOLIDAGO <i>flexicaulis</i> . Sp. 7. Virga aurea montana, scrophularia folio.	-	-	8
132 SOLIDAGO <i>virga aurea</i> . Sp. 9. Solidago caule erecto, racemis alter- nis erectis.	-	-	10
133 STATICE <i>armeria</i> . Sp. 1. fol. 394. Limonium aphylo caulon gramineum globosum.	-	-	10
134 TANACETUM <i>vulgare</i> . Sp. 7. fol. 1184. Athanasia sive Tanacetum vulgare lu- teum.	-	-	6
135 Tana-			



Nro

- 123 Steinbrech aus Pensylvanien mit dicken fleischlichten Blättern, rothen schönen Blumen.
- 124 Hauswurz oder gemeines Bruchkraut, insgemein Knabenkraut genannt, mit weißen und purpurrothen Blumen.
- 125 Das höchste Newjorkische Schartenkraut, mit weichem Doriablatt, die hohe Seratula mit purpurvioleten Blumen.
- 126 Filipendel oder rother Steinbrech mit gefüllten Blumen.
- 127 Weißer Geißbart mit gefüllten Blumen.
- 128 Schmalblättrige Goldrute aus Canada, mit großen Blumensträußen.
- 129 Späte kleinblättrige glatte Goldrute aus Morgenland.
- 130 Mexicanische Goldrute mit sehr breiten und glatten Meerlavendel Blättern.
- 131 Canadische Goldrute mit braunen Wurzelblättern, und dünnen Schlangenstängeln.
- 132 Gemeine Goldrute, heidnisches Wunderkraut.
- 133 Größere Bergquellen mit kugelförmigen rothen Blumen.
- 134 Gemeiner gelber Reinfarn.

Nro V

		Q.	fl.	fr.
135	TANACETUM <i>Balsamita</i> . Sp. 8. Costus hortorum balsamita.	-	-	10
136	TEUCRIUM <i>Virginianum</i> . Sp. 17. fol. 789.	-	-	12
137	THALICTRUM <i>flavum</i> . Sp. 10. fol. 770. Thalictrum majus, flavum floribus lu- teis folio glauco. B.	-	-	10
138	VALERIANA <i>rubra</i> flore albo. B. fol. 44. Valeriana maritima alba, sive marima latifolia flore albo.	-	-	8
139	VALERIANA <i>officinalis</i> . Sp. 5. Valeriana palustris major.	-	-	6
140	VERATRUM <i>nigrum</i> . Sp. 2. fol. 1479. Heleborus albus flore atro rubente.	-	-	10
141	VERONICA <i>longifolia</i> . Sp. 5. fol. 13. Veronica spicata latifolia.	-	-	10
142	VERONICA <i>incana</i> Sp. 6. Veronica spicata & incana floribus cœ- ruleis.	-	-	8
143	VERONICA <i>latifolia</i> . Sp. 24. Veronica pratensis omnium maxima.	-	-	10



- 135 Römische Salben, große Frauensalben.
- 136 Gamanderlein mit ungleich sägeförmig gezähnten Blättern, und blauen Blumensträußen, das wilde Marum.
- 137 Große gelbe Wiesenrauthe, deren Blätter und Stängel einen meergrünen Beschlag haben.
- 138 Breit oder schmalblättriger Meerbaldrian, mit rothen oder weißen Blumen.
- 139 Großer wilder Baldrian.
- 140 Weiße Nießwurz mit kleinen schwarzrothen Blumen.
- 141 Breit oder langblättriger Ehrenpreis mit langen blauen Blumenähren.
- 142 Kleiner grauer wolliger Ukränischer Ehrenpreis mit langen blauen Blumenähren.
- 143 Größerer breitblättriger gerade stehender Ehrenpreis, mit blauen Ährenblumen.





Drittes Verzeichniß.

Freib - und Glashaus - Gewächse.

Latcinische Benennung.

Nro *	Q	fl.	fr.
1 ♀ ACANTHUS <i>mollis</i> . Sp. 1. fol. 891. Acanthus fativus five mollis Virgilii.	-	-	15
2 ♀ ACANTHUS <i>medius</i> . Gledt. Acanthus medius, foliis aculeis rario- bus, inermibus, & brevioribus or- natis.	-	-	20
3 ♀ ACANTHUS <i>spinosus</i> . Sp. 2. Acanthus aculeatus. Alaternus. siehe Rhamnus. Alaternoides. siehe Phyllica.	-	-	18
4 ♀ ANNONA <i>asiatica</i> . Sp. 7. fol. 758. Quanabanus fructu purpureo.	-	-	20
5 ♀ ANTHYLLIS <i>barba Jovis</i> . Sp. 6. fol. 1013. Barba Jovis pulchre lucens.	-	-	30
6 ♀ ARTHEMISIA <i>arborescens</i> . Sp. 15. fol. 1188. Absinthium latifolium arborescens.	-	-	20
7 ♀ * ASCLEPIAS <i>Curassavica</i> . Sp. 9. fol. 314. Apocinum radice fibrosa, petalis cocci- neis, cuniculeis croceis flore cocci- neo.	-	-	15
8 ♀ * ASCLEPIAS <i>frutescens</i> . Sp. 14. Apocinum erectum africanum, villoso fructu, salicifolio, flore albo.	-	-	10

Drittes Verzeichniß.

Treib - und Glashaus - Gewächse.

Deutsche Benennung.



Nro.

- 1 Wälsche Bärenklau.
- 2 Morgenländische Bärenklau mit einzelnen kurzen und weichen Stacheln.
- 3 Stachelichte Bärenklau aus Portugall.
- 4 Der Flaschenbaum, der Purpurapfel.
- 5 Cretischer Ebenbaum, der Silberbusch, Jupiters Bart.
- 6 Staudigter Meerwermuth.
- 7 Langblättriger kleiner Hundskohl von Curasao, mit scharlachfarbigen innen citronengelben Blumen, orangefarbiges Apocinum.
- 8 Der Seitenbaum, die hohe afrikanische Hundskohlstaude, mit schmalen Weidenblättern, weißen Blumen, und weichstachelichten Früchten, das weiße Apocinum.

Nro *

	Q	fl.	fr.
9 ♀ ATRIPLEX <i>halymus</i> . Sp. 1. fol. 1492. Halymus latifolius vulgo fructicosus.	-	-	15
10 ♀ ATRIPLEX <i>portulacoides</i> . Sp. 2. Halymus sive portulaca marina.	-	-	15
11 ♀ AYENIA <i>pusilla</i> . Sp. 1. fol. 1354. Dayenia inermis, foliis oblongo, cordatis marginibus dentatis, floribus exillaribus.	-	-	20
12 ☉ * BASELLA <i>rubra</i> . Sp. 1. fol. 390. Basella fructu rubro.	-	-	5
13 ☉ * BASELLA <i>alba</i> . Sp. 2. Batella flore albo, & caulibus viridibus.	-	-	5
14 ♀ * BRYONIA <i>Cretica</i> . Sp. 6 fol. 1439. Bryonia alba maculata.	-	-	6
15 ♀ BUPHTALMUM <i>frutescens</i> . Sp. 1. fol. 1273. Asteriscus frutescens, leucoji foliis ferriceis & incanis.	-	-	20
16 ♀ * CARICA <i>papaya</i> . Sp. 1. fol. 1466. Papaya fructu oblongo, melonis effigie.	1	-	30
17 ♀ CERATONIA <i>siliqua</i> . Sp. 1. fol. 1513. Siliqua dulcis.	-	-	24
18 ♀ CERCIS <i>siliquastrum</i> . Sp. 1. fol. 534. Arbor Judæ, Siliqua sylvestris rotundifolia.	-	-	24
19 CERCIS <i>siliquastrum</i> . flore albo. β. Chenopodium frutescens.	-	-	30
20 ♀ CHRYSANTHEMUM <i>frutescens</i> . Sp. 1. fol. 1251. Levcanthemum frutescens sapore pyretri.	-	-	20



Nro

9 Die breitblättrige Meermeldenstaude.

10 Meerportulack, die staudige Meerportulack-Melde.

11 Ahenia mit herzförmigen glatten Blättern.

12 Kletternder Nachtschatten mit dunkelrothen Beeren und rothen Blättern.

13 Kletternder Nachtschatten mit weißen Blättern und weißen Beeren.

14 Eretische Zaunrübe mit gezackten Blättern, mit roth und weiß gestreiften Früchten.

15 Das staudige virginische Rindsaug, mit schmalen silbergrauen und seidenhaften leucocoen - Blättern.

16 Der Papanabaum mit einer Frucht, die den Melonen gleicht. Der Melonenbaum.

17 Johannisbrod Baum, Heuschrecken-Baum, Goodbrod - Baum.

18 Judasbaum mit rothen Blumen.

19 Judasbaum mit weißen Blumen.

20 Spanisches unächtes Rindsaug aus den Canarischen Inseln.


Nro *

	Q.	l.	ft.
21 ♂ CINERARIA <i>maritima</i> . Sp. 9. fol. 1244. Jacobea <i>maritima</i> .	-	-	12
22 ♂ CISTUS <i>salvifolius</i> . Sp. 10. fol. 738. Cistus <i>fœmina folio salviæ</i> .	-	-	25
23 ♂ CISTUS <i>crispus</i> . Sp. 11. Cistus <i>mas, foliis chamædryos</i> .	-	-	25
24 ♀ C. TRUS <i>medica</i> . Sp. 1. fol. 1100. Malus <i>medica</i> . Cedro cum suis varietatibus.	-	-	35
25 ♀ CITRUS <i>limon vulgaris</i> . β. Malus <i>limonia accida</i> .	-	-	45
26 ♀ CITRUS <i>aurantium</i> . Sp. 2. Malus <i>aurantia major</i> . Aurantia <i>mala</i> .	-	-	35
27 ♀ CITRUS <i>sinensis</i> . Sp. 3. Aurantia <i>sinensis</i> . β.	-	-	35
28 ♀ Aurantia <i>acri</i> . C.	-	-	45
29 ♀ Pompelmus. D.	-	-	35
30 ♀ CLEOME <i>monophylla</i> . Sp. 14. fol. 940. Sinapistrum <i>Zeylanicum, viscosum, folio solitario, flore flavo, filiqua tenui</i> .	-	-	15
31 ♀ CNEORUM <i>triccocum</i> . Sp. 1. fol. 49. Chamælea <i>tricoccos</i> .	-	-	25
32 ♂ * COFFEA <i>arabicum</i> . Sp. 1. fol. 245. Jasminum <i>arabicum, laurifolio, cujus semen apud nos Coffe dicitur</i> .	1	-	20
33 ♂ COLUTEA <i>frutescens</i> . Sp. 2 fol. 1045. Colutea <i>æthiopica flore purpureo</i> .	-	-	20



Nro

- 21 Graues wolliges Meer-Jacobskraut mit gelben Blumen.
- 22 Eistusstrauch mit grauen weichen Blättern, weißen oder purpurrothen Blumen.
- 23 Eistenröslein mit weißen Blumen.
- 24 Der Zitronenbaum. Von diesen giebt es gar viele Abänderungen, welche in Cedraten, Limonen, Zitronen ic. abgetheilet, wovon eine besondere Beschreibung folgen wird.
- 25 Die gemeine saure oder Küchenzitrone.
- 26 Der gemeine Pomeranzenbaum.
- 27 Süße Pomeranzen.
- 28 Sauere Pomeranzen.
- 29 Pomelmoes. Man hat von Pomeranzen sehr viele Abartungen, deren Benennungen ich mit den Zitronen zu beschreiben Willens bin.
- 30 Die Ceyländische Eleone mit weichem Stängel und gelben Blumen.
- 31 Spanischer Zeiland, Ceilandt, mit kleinen gelben Blumen, rothen Früchten.
- 32 Der Coffeebaum, arabischer Jasmin.
- 33 Die äthiopische Blasenfenne mit rothen Blumen.



Nro *

	Q	fl.	fr.
34 ♀ CORNUS <i>arubet</i> nova species.	-	-	30
35 ♀ CORIARIA <i>myrtifolia</i> . Sp. 1. fol. 1467. Rhus <i>myrtifolia</i> monspeliaca.	-	-	35
36 4 CUPRESSUS <i>sempervirens</i> . Sp. 1. fol. 1422. Cupressus meta in fastigium convolutus, sive foemina.	-	-	30
37 4 CUPRESSUS <i>sempervirens horizontalis</i> . β. Cupressus ramos extra se spargens, sive mas.	-	-	30
38 DIOSPYROS <i>Lotus</i> . Sp. 1 fol. 1510. Lotus africana latifolia.	-	-	35
39 V DRACOCEPHALUM <i>Canariense</i> . Sp. 2. fol. 829. Cedronella Canariensis viscosa foliis plerumque ex eodem pediculo ternis.	-	-	30
40 h FICUS <i>Carica</i> . Sp. 1. fol. 1513. Ficus communis.	-	-	20
b. Die braune, oder castanienförmige, insgemein Ischiafeige genant.	-	-	30
c. Die schwarze genuesische Feige, bey uns die schwarze Beuschetfeige genannt.	-	-	30
d. Die kleine weiße ganz runde Feige	-	-	35
e. Die große weiße Genueserfeige.	-	-	35

f. Die

Nro

- 34 Der afrikanische Zieserleinsbaum.
- 35 Berbermyrte von Montpellier.
- 36 Gemeiner Cypressenbaum.
- 37 Der Cypressenbaum mit ausgebreiteter Krone, das Männlein genannt.
- 38 Indianische Dattelpflaume.
- 39 Die morgenländische drenblättrige unächte Staudenmelisse. Balsam von Gilead.
- 40 Gemeiner Feigenbaum mit seinen Abartungen.
- b. Ist ben nahe die größte, kurz, rund, hat ein großes Aug, inwendig purpurroth mit großen Kernen.
 - c. Ist länglicht, ganz schwarz, mit feinem lichtrothen Thau ganz bestreut, inwendig hellroth mit hochgelbem Fleisch, ist eine der besten.
 - d. Ist ganz glatt mit sehr kurzem Stiel, blaßgelb, inwendig weiß und süß.
 - e. Wird groß, rund, gegen den Stiel länglicht, mit einer dünnen gelblichten Haut, inwendig roth, ist eine gute, trägt bey uns nicht gerne, die Blätter sind die größten, und lichtgrün.

f. Ist

Nro *

	Q	fl.	kr.
f. Die Maltheserfeige mit sehr süßem schmackhaften Fleisch.	-	-	30
g. Die dunkelbraune Neapolitanische Feige.	-	-	35
h. Die lange braune Neapolitanische Feige.	-	-	36
41 24 FICUS <i>Bengalensis</i> . Sp. 4. Ficus Bengalensis, folio subrotundo fructu orbiculato.	-	I	30
42 ♂ FICUS <i>Indica</i> . Sp. 5. Ficus Indica Theophrasti. Genista. siehe Spartium.	-	I	20
43 ♀ * GERANIUM <i>fulgidum</i> . Sp. 1. fol. 945. Geranium africanum folio alceæ, flore coccineo fulgidissimo.	-	-	20
44 ♂ GERANIUM <i>inquinans</i> . Sp. 2. Geranium africanum arborescens, malvæ folio pingui, flore coccineo.	-	-	25
45 ♀ GERANIUM <i>papilionaceum</i> . Sp. 3. Geranium africanum, arborescens, flore veluti dipetalo, eleganter variegato.	-	-	25
46 ♂ GERANIUM <i>cucullatum</i> . Sp. 6. Geranium africanum arborescens, foliis cucullatis angulosis.	-	-	20

47 ♂ Ge.

f. Ist mittelmäßig, blaßbraun, oben zusammen gepreßt, lang gegen den Stiel, stark gekneipt, ist bey uns die gemeinste und beste, trägt gerne.

g. Ist groß, rund, von lichtbrauner Farbe, und einigen schwachen weißen Streifen, das Fleisch ist roth mit großen Körnern, ist mittelmäßig.

h. Die Frucht ist lang, an der Krone zusammen gepreßt, die Stiele sind sehr lang, die Haut hat eine dunkelbraune Farbe, das Fleisch ist roth und wohl geschmackt, zeitiget und trägt gerne.

41 Der bengalische Feigenbaum, mit großen breiten glänzenden Blättern.

42 Der indianische Feigenbaum.

43 Der afrikanische Storchschnabel mit zerfetzten langen gefrausten Blättern, und der höchsten Scharlachfarbe, ist hoch und zart.

44 Der höchste afrikanische Storchschnabel mit großen fetten glänzenden Pappelblättern, und großen scharlachrothen Blumen.

45 Afrikanischer hoher staudigter Storchschnabel mit rothen gefleckten Papilionenblumen, ähnlichen Blüthen.

46 Der höchste afrikanische Storchschnabel mit den größten weichen Pappelblättern, welche rund und hohl sind, mit purpurrothen Blumen.


Nro *		℥	℥	℥
47	♂ GERANIUM <i>gibbosum</i> . Sp. 7. Geranium noctuolens, tuberosum & nodosum aquilegiæ folio.	-	-	25
48	♀ GERANIUM <i>carnosum</i> . Sp. 8. Geranium africanum carnosum, petalis angustis albicantibus.	-	-	25
49	♀ GERANIUM <i>peltatum</i> . Sp. 9. Geranium africanum foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agriæ maculatis, splendentibus & acetoso sapore.	-	-	30
50	♀ GERANIUM <i>acetosum</i> . Sp. 10. Geranium africanum frutescens folio crasso & glauco acetoso sapore.	-	-	25
51	♂ GERANIUM <i>zonale</i> . Sp. 11. Geranium africanum arborescens, Al- chemillæ folio hirsuto, floribus ru- bicandis.	-	-	10
52	♀ GERANIUM <i>zonale</i> foliis ex aureis ma- culatis. Geranium africanum foliis ex luteo & virido maculatis flore purpureo. β.	-	-	25
53	♂ GERANIUM <i>zonale</i> foliis argenteis ma- culatis. Geranium africanum foliis ex albo & virido maculatis. ε.	-	-	15

- 47 Der afrikanische aufrechte Storchschnabel mit knollichten Stängeln und Ackersenblättern mit gelbbraunen Blumen, welche bey Nacht sehr angenehm riechen.
- 48 Staudichter afrikanischer Storchschnabel mit fleischigen Stängeln, und kleinen Alceasblättern, mit weißen ganz kleinen riechenden Blumen.
- 49 Afrikanischer staudiger Storchschnabel mit fleischigen, fünfstheiligen, schildförmigen, glatten, gefleckten Portulackblättern, welche sauer sind, und violetblauen Blättern.
- 50 Hochstaudiger Storchschnabel mit dicken fleischen meergrünen Blättern, mit Sauerkraut-Geschmack, mit kleinen weißrothen Blumen.
- 51 Hochstaudiger Storchschnabel mit runden dunkelgrünen Blättern, mit schwarzem Zirkel und pferfingblattförmiger Blume. Von dieser Sorte habe ich bey zehn Abartungen, welche ich durch erhaltenen Saamen gezogen habe, und immer höher in schöneren Farben sich von einander unterscheiden.
- 52 Storchschnabel aus Afrika mit runden gelb und grün gefleckten Blättern, mit schwarzem Zirkel, und hochrother Blume; eine ganz neue Sorte.
- 53 Afrikanischer Storchschnabel mit runden weiß und grün makulirten Blättern und pferfingblutfärbigen Blumen.



Nro *	℞	fl.	fr.
54 ♂ GERANIUM <i>vitifolium</i> . Sp. 12. Geranium africanum arborescens, vitifolio, odore melisse.	-	-	25
55 ♂ GERANIUM <i>capitatum</i> . Sp. 13. Geranium africanum frutescens, malvæ folio, laciniato odorato.	-	-	25
56 ♀ GERANIUM <i>hybridum</i> . Sp. Ist nicht in Lin. weder in Müll. Lex. noch in Gledt. vorzufinden.	-	-	20
57 ♀ GERANIUM <i>alchemiloides</i> . Sp. 15. Geranium africanum alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis.	-	-	25
58 ♀ GERANIUM <i>odoratissimum</i> . Sp. 16. Geranium africanum humile, folio fragrantissimo molli, vulgo Geranium muscatum.	-	-	20
59 ♀ GERANIUM <i>myrrhifolium</i> . Sp. 21. Geranium æthiopicum, myrrhidis folio, flore magno striato.	-	-	35
60 ♀ GERANIUM <i>lobatum</i> . Sp. 23. Geranium africanum noctuolens, tuberosum, vitis foliis hirsutis.	-	-	35
61 ♀ GERANIUM <i>triste</i> . Sp. 24. Geranium noctu olens, æthiopicum, radice tuberosa, folio myrrhidis latioribus & angustioribus.	-	-	30
62 ♀ GNAPHALIUM <i>stæchas</i> . Sp. 9. fol. 1193. Elychrysum, five Stæchas Citrina angustifolia.	-	-	20

63 ♀ Gna-



Neo : 22

- 54 Staudiger Storchschnabel mit zerfetztem rauhen Weinblatt und Melissengeruch, dann blauröthlichten Blumen.
- 55 Storchschnabel mit krausfältig weichhaarigen zerlapten kleinen, stark riechenden Pappelblättern und klauen Blumen.
- 56 Storchschnabel mit kleinen runden dunkelgrünen Blättern, und scharlachrothen Blumen, welche meist das ganze Jahr blühen.
- 57 Niedriger Storchschnabel mit runden abgetheilten rauhen und schwarz gefleckten Blättern und kleinen weißen Blumen.
- 58 Niedrigster Storchschnabel mit ganz weichen herzförmigen lieblich riechenden Bischofblättern, und sehr kleinen weißen Blumen, insgemein das wohlriechende Muscatengeranium.
- 59 Knottenwurzlichter niedriger afrikanischer Storchschnabel mit Anemoneblättern und blasweißen dunkelroth gestreiften prächtigen Blumen, ist zart.
- 60 Niedriger Storchschnabel mit zerfetzten Blättern, weiß und roth makulirten Blumen, und knottigter Wurzel, ist zart.
- 61 Der niedrige äthiopische Storchschnabel mit knolllichten Wurzeln, und Myrrhen-Körbelblättern, mit gelb und schwarzbraun gestreiften Blumen, welche des Nachts sehr angenehm riechen.
- 62 Die schmalblättrige Reinblumenstaude.

Nro *

	Q	fl.	fr.
63 V GNAPHALIUM <i>orientale</i> . Sp. 17. Helichrysum frutescens latifolium flo- re corymbifero toto aureo.	-	-	25
64 V GNAPHALIUM <i>fœtidum</i> . Sp. 26. Gnaphalium africanum fœtidum, capi- tulo argenteo vel aureo.	-	-	25
65 V GNAPHALIUM <i>undulatum</i> . Sp. 27. Helichrysum graveolens acutifolium, caule alato.	-	-	20
66 ♂* GOSSYPIUM <i>herbaceum</i> . Sp. 1. fol. 975 Gossypium frutescens semine albo.	-	-	25
67 ♂* GOSSYPIUM <i>Barbadense</i> . Sp. 2. Gossypium frutescens annuum folio trilobo barbadense.	-	-	25
68 ♀* HELIOTROPIUM <i>peruvianum</i> . Sp. 1. fol. 187. Heliotropium foliis ovato, lanceolatis, spicis plurimis confertis, vulgo He- liotropium odore vanili.	-	-	40
69 ♂ HIBISCUS <i>syracus</i> flore violaceo. Sp. 12. fol. 978. Althæa arborefcens Syriaca. Ketmia Syrorum flore cœruleo.	-	-	20
♂ b. Hibiscus Syriacus flore rubro. Althæa Syrorum flore rubro.	-	-	24
♂ c. Hibiscus Syriacus flore albo. Althæa Syrorum flore albo.	-	-	24
♂ d. Hibiscus Syrorum flore albo umbo- ne cœruleo.	-	-	24
♂ e. Hibiscus mutabilis. Sp. 9. Althæa arborea, rosa sinensis.	-	-	24

- 63 Die morgenländische ewige Blume, das gelbe Gnaphalium genannt, das große und das kleine Blafgelbe.
- 64 Die große Capische Reinblume mit wolligen stinkenden Blättern, und silber- oder goldfarbigen glänzenden Blumenknöpfen, das stinkende Bockskraut genannt.
- 65 Stinkende Sonnen- Goldblume, mit spitzigem Blatt, und gefiedertem Stängel.
- 66 Die Baumwollenstaude mit kleinen Früchten, die grasartige Baumwolle genannt.
- 67 Der Baumwollenbaum aus Barbados, mit großen Früchten, und schönen gelben Alceasblumen.
- 68 Die Peruvianische Sonnenwendenstaude, mit weißblaulichten wohlriechenden Blumen. Die Sonnenwende genannt.
- 69 Die Syrische Ketmiastaude, oder der Syrische Pappelbaum mit rothblauen Blumen.
 - b. Die Syrische Ketmia mit rothen Blumen.
 - c. Der Syrische Pappelbaum mit weißen Blumen.
 - d. Die Syrische Ketmia mit weißen Blumen und rothen Früchten.
 - e. Die Sinesische oder Martinikische Rose, macht einen sehr hohen Strauch.

Nro *

	Q	fl.	fr.
70 ♂ <i>HIBISCUS manihot. Sp. 17.</i> Ketmia folio manihot serrato, flore amplo sulphureo.	-	-	15
71 ♂ <i>HIBISCUS malvaviscus. Sp. 10.</i> Malvaviscus arborescens, flore miniato glauco.	-	-	20
72 ♀ <i>HIBISCUS abelmoschus. Sp. 18.</i> Althæa hirsuta, flore flavo, semine moschato.	-	-	25
73 ♂ <i>JASMINUM grandiflorum. Sp. 2. fol. 9.</i> Jasminum Catalonicum, sive Hispanicum flore majore extus rubente, vulgo Jasminum Romanum.	-	1	-
74 ♂ <i>JASMINUM azoricum. Sp. 3.</i> Jasminum azoricum trifoliatum, flore albo odoratissimo.	-	1	-
75 ♂ <i>JASMINUM odoratissimum. Sp. 6.</i> Jasminum Indicum flavum odoratissimum.	-	1	-
♂ a. <i>Jasminum officinale. Sp. 1.</i> Jasminum vulgare flore albo.	-	-	20
♂ b. <i>Jasminum fructicans. Sp. 4.</i> Jasminum luteum, vulgo bacciferum dictum.	-	-	10
♀ c. <i>Jasminum humile. Sp. 5.</i> Jasminum humile luteum.	-	-	15
76 ♀ <i>JATROPIA urens. Sp. 6. fol. 1429.</i> Jussievia herbacea spinosissima urens, foliis digitatis & laciniatis.	-	-	35
77 ♂ <i>IBERIS semper florens. Sp. 1. fol. 904.</i> Thlaspidum fructicosum, Levcoji folio, semper virens, & florens.	-	-	25

70 Die amerikanische Ketmia, mit Melonenbaum-Blättern, und großen blaßgelben Blumen.

71 Der Malwawiscus, die amerikanische unächte Alhåenstaude mit zusammen gezogenen Korallenrothen Blumen

72 Die Abelmoschpappel, oder Bisamsaamenstaude.

73 Catalonischer Jasmin mit großen weißen Blumen.

74 Der hohe drenblättrige azorische weiße Jasmin mit großen breiten Caffeeblättern.

75 Der große wohlriechende indianische Jasmin mit gelben Blumen.

a. Gemeiner weißer Jasmin.

b. Gemeiner hochstaudiger gelber Jasmin ohne Geruch.

c. Der italienische niedrige gelbe Jasmin. Die letzten dren Sorten gehören ins freye Land.

76 Die stachlichte brennende und grasartige Jatropha, mit gefiederten und zerfetzten Blättern.

77 Thlaspis, oder immer blühender Eretischer Federbaum mit weißen Blumen.

Nro *		Q	fl.	fr.
78	♂ IBERIS <i>semper florens</i> foliis ex aureis variegatis. Thlaspidium fructicosum, Levcoji folio, ex aureo variegato semper virens & florens.	-	-	40
79	4 JUSTICIA <i>adhatoda</i> . Sp. 1. fol. 20. Adhatoda ceylanica. Echbolum Rivini.	-	-	35
80	♀ LANTANA <i>trifoliata</i> . Sp. 1. fol. 873. * Camara trifolia, purpurascens flore.	-	-	30
81	♂ LANTANA <i>Camara</i> . Sp. 4. * Viburnum americanum, non spinosum, Melisse foliis, floribus coccineis.	-	-	45
	♀ h. Lantana <i>Camara</i> floribus variegatis. Camara alia flore variegato non spinoso.	-	-	45
82	♀ LAVANDULA <i>multifida</i> . Sp. 2. fol. 800. Lavandula folio dissecto.	-	-	12
83	✓ LAVANDULA <i>dentata</i> . Sp. 3. Stoechas folio serato.	-	-	10
84	♂ LAVATERA <i>arborea</i> . Sp. 1. fol. 972. Malva arborea veneta, parvo flore.	-	-	12
85	♀ LAVATERA <i>alba</i> . Sp. 3. Althea frutescens, folio acato, parvo flore.	-	-	10
86	♀ LAVATERA <i>trilobata</i> . Sp. 4. Althea frutescens, folio rotundiore incano.	-	-	10
87	h LAURUS <i>nobilis mas</i> . Sp. 5. fol. 539. Laurus vulgaris.	-	-	25
88	h LAURUS <i>nobilis femina</i> . a. Laurus latifolia Dioscoridis.	-	-	30

Nro

78 Federbaum mit gelb und grün gestreiften Blättern.

79 Malabarischer Nußbaum, der falsche Muscatnußbaum, Muscatenbaum.

80 Der breitblättrige Angelnund mit einer purpurrothen Blume.

81 Glatter amerikanischer Mehls-trauch mit Mehlissenblättern und hellrothen Blumen. Gelbes Viburnum genannt.

b. Kleiner glatter amerikanischer Mehls-trauch mit gelb und roth scheckigen Blumen.

82 Doppelt gefiederter Lavandel, Stöchas-kraut genannt.

83 Stöchas-kraut mit breiten ausgezackten Blättern, insgemein der gezackte Lavandel.

84 Der unächte staudige, rundblättrige venetische Meeribisch, die höchste Pappelstaud mit runden sehr großen Blättern.

85 Der unächte staudige Ibisch, mit zugespitzten Blättern, und kleinen rothen Blumen.

86 Der drehblättrige lavaterische Pappel mit purpurrothen Blumen, und rundem grauen Blatt.

87 Gemeiner Lorbeerbaum.

88 Breitblättriger Lorbeerbaum des Dioscorides.

Nro *

	Q.	d.	ft.
89 24 LAURUS <i>undulatus</i> . Gledt. Laurus vulgaris folio undulato. Laurus Indica.	-	-	25
90 24 LAURUS <i>Indica</i> , latifolia, laurus regia & aldina. Lin. Sp. 6.	-	-	45
91 24 LAURUS <i>Camphora</i> . Lin. Sp. 3. Laurus Camphorifera Japonica.	-	1	5
92 V LOBELIA <i>Cardinalis</i> Sp. 12. fol. 1320. Rapuntium calceatum Virginianum, coccineo flore majore, vulgo Flos Cardinalis.	-	-	45
93 V LOTUS <i>Jacobeus</i> . Sp. 10. fol. 1091. Lotus angustifolia, flore luteo purpu- rascente, insulæ St. Jacobi.	-	-	20
94 ♂ LYCIUM <i>barbarum</i> . Sp. 2. fol. 277. Jasminoides chinense, halymi folio longiore & angustiore.	-	-	24
95 24 MAGNOLIA <i>grandiflora</i> . Sp. 1. fol. 755. Magnolia altissima, lauro cerasi folio, flore ingenti specioso candido.	-	2	45
96 ♂ MALVA <i>tomentosa</i> . Sp. 2. fol. 967. Althæa orientalis bidens, subrotundis foliis, floribus parvis luteis.	-	-	45
97 ♂ MALVA <i>scabrosa</i> B Sp. 9. Malva africana frutescens flore rubro.	-	-	30
98 ♀ MARUBIUM <i>africanum</i> . Sp. 6. fol. 816. Pseudo dictamus africanus, foliis sub- rotundis subtus incanis.	-	-	35
99 ♂ MEDICAGO <i>arborea</i> . Sp. 1. fol. 1096. Cytisus incanus, siliquis falcatis.	-	-	24



Nro

- 89 Gemeiner Lorbeer mit wellenförmigen Blättern.
- 90 Der unächte Zimmtbaum, der ostindische breitblättrige Lorbeerbaum.
- 91 Der Campherbaum.
- 92 Die große Cardinalsblume mit großen scharlachfarbigen Blumen.
- 93 Steinklee von St. Jacobs Insel, der Jacobs Lotus genannt, mit dunkelbraunen Sametblumen.
- 94 Der Chinesische Bastard-Jasminstrauch.
- 95 Die große karolinische Magnolia, der Biber, der Zulpen-Lorbeerbaum mit sehr großen breiten glänzenden laurusblättern, sehr großen prächtigen weißen Blumen.
- 96 Die orientalische Althea mit rundlechten Blättern, und kleinen gelben Blumen.
- 97 Die afrikanische Althea mit kleinen gelbfarbigen Blumen.
- 98 Der afrikanische unächte Wirbelstam mit gerundeten, herzförmigen unterwärts weißen Blättern.
- 99 Der große graue Mondenklee-strauch mit kleinen gelben Blumenbüscheln.

Nro *		Q	fl.	fr.
100	♂ MELIA <i>azedarach</i> . Sp. 1. fol. 550. Azedarach Dodonei. Arbor amoris.	.	-	30
101	♂ MELIANTHUS <i>major</i> . Sp. 1. fol. 892. Melianthus africanus.	-	-	10
102	♂ MELIANTHUS <i>minor</i> . Sp. 2. Melianthus africanus minor foetidus.	-	-	15
103	✓* MIMOSA <i>pernambucana</i> . Sp. 20. fol. 1502. Mimosa spuria dePernambuque dicta, vulgo sensitiva mas.	.	-	10
104	✓* MIMOSA <i>pudica</i> . Sp. 14. Mimosa humilis & frutescens, spino- sa, siliquis congestis, noli me tange- re hortulanorum vulgo.	-	-	12
105	♂* MIMOSA <i>farnesiana</i> . Sp. 33. Acacia Indica farnesiana, vulgo Aca- cia ægyptiaca.	-	-	45
106	♂* MIMOSA <i>asperata</i> . Sp. 38. Mimosa frutescens spinosa, & aculea- ta siliquis hirsutis.	-	-	45
107	h* MUSA <i>paradisiaca</i> . Sp. 1. fol. 1477. Musa fructu cucumerino longiori.	-	1	30
108	24 MYRTUS <i>communis</i> . Sp. 1. fol. 673. Myrtus latifolia Romana.	-	-	30
	24 b. Myrtus communis angustifolia. Myrtus Italica ramis rectioribus, fo- liis ovato - lanceolatis acutis.	-	-	30
	24 c. Myrtus communis flore pleno.	-	1	20
	24 d. Myrtus communis mucronata. Myrtus foliis minimis mucronatis.	-	-	30

Nro

- 100 Der Vater noster - Baum. Der unächte
Brustbeerbaum.
- 101 Der große afrikanische Honigbaum. Gro-
ßer afrikanischer Pimpinellenbaum.
- 102 Kleiner Honigbaum.
- 103 Das träge oder wenig empfindliche Fühl-
kraut, oder die unbewegliche *Sensitiva mas-*
cula.
- 104 Das niedrige sehr empfindliche Fühlkraut,
insgemein das Jungfernkraut, *Sensibilis*.
- 105 Indianische auch ägyptische *Acacia* mit kur-
zen runden wohlriechenden gelben Blumen-
knöpfen.
- 106 *Acacia* von der Insel Vera Cruz, mit lan-
gen Stacheln und *Acacien*blättern.
- 107 Der Pifang, Adamsfeige, der Paradiesfei-
genbaum genannt.
- 108 Breitblättriger römischer Myrtenbaum, *Jus-*
denmyrtus.
- b. Feiner, schmal- und spitzblättriger italiäni-
scher Myrtenbaum.
- c. Schmalblättriger Myrtus mit gefüllten
Blumen
- d. Krausblättriger Myrtus mit sehr feinen
glänzenden Blättern.
- e. Kraus

Nro *		Q	fl.	fr.
♂e.	Myrtus communis mucronata foliis minimis ex albo & virido maculatis.	-	1	20
♂f.	Myrtus Belgica. Müll. Myrtus latifolia Belgica.	-	-	35
♂g.	Myrtus acuta. Müll. Myrtus sylvestris foliis acutissimis.	-	-	30
109 4	NERIUM Oleander. Sp. 1. fol. 305. Nerium floribus rubescentibus.	-	-	30
110 4	NERIUM Oleander floribus rubescentibus. β. Nerium floribus copiosis colore rubro β.	-	-	45
111 4	NERIUM Oleander floribus albis. Nerium floribus albis.	-	-	45
112 4	NERIUM Indicum. Nerium Indicum angustifolium floribus odoratis simplicibus.	-	-	45
113 4	NERIUM Indicum flore pleno. Nerium Indicum angustifolium floribus odoratis plenissimis.	-	1	30
114 ♂	NYCTANTHES sambac. Sp. 1. fol. 3. Jasminum Indicum mali aurantii folio, flore albo magno odorato semipleno. Jasminum Arabum.	-	-	45
115 h	OLEA Europea. Sp. 2. fol. 11. Olea fativa.	-	1	1
116 v	ORIGANUM tenuifolium perenne. β.	-	-	8

- e. Krausblättriger Myrtus mit weiß und grün
makulirten feinen Blättern.
- f. Breitblättriger holländischer Myrtenbaum.
- g. Wilder Myrtenbaum mit sehr scharf zuge-
spitzten Blättern.
- 109 Oleanderbaum mit lang gespitzten Blättern,
und pferfingfärbigen Blumen, der Lorbeer-
Rosenstrauch genannt.
- 110 Oleander mit ganz rothen Blumen, und
kürzern Blättern.
- 111 Oleander mit ganz weißen Blumen.
- 112 Malabarischer schmalblättriger Oleander
mit blaßrothen wohlriechenden Blumen.
- 113 Malabarischer schmalblättriger Oleander
mit großen gefüllten rothen Blumen, ist
die zarteste und schönste.
- 114 Arabischer Jasmin mit Pomeranzenblättern,
und weißen großen wohlriechenden Blumen.
- 115 Zahmer Ölbaum, oder fruchttragender Öl-
baum, wovon das Baumöl gemacht wird.
- 116 Gemeiner schmalblättriger Wintermajoran.

Nro *

	fl.	fr.
117 ♀ * PASSIFLORA <i>ferratifolia</i> . Sp. 1. fol. 1355. Granadilla americana, folio oblongo leviter ferrato, petalis ex viridi rubescentibus.	-	-
118 ♀ * PASSIFLORA <i>Vespertilio</i> . Sp. 13. Granadilla bicornis, flore candido, filamentis intortis.	-	-
119 ♀ * PASSIFLORA <i>lutea</i> . Sp. 17. Clematis passionalis triphyllos, flore luteo.	-	45
120 ♀ * PASSIFLORA <i>suberosa</i> . Sp. 18. Flos passionis curassavicus, folio glabro, trilobato & angusto, flore flavescente omnium minimo.	-	35
121 ♀ * PASSIFLORA <i>holosericea</i> . Sp. 19. Granadilla folio hastato holoserico, petalis candicantibus, fimbriis ex purpureo & luteo variis.	-	-
122 ♀ * PASSIFLORA <i>minima</i> . Sp. 22. Flos passionis curassavicus, flore flavescente omnium minima, folio glabro trilobato & angusto.	-	30
123 ♀ * PASSIFLORA <i>cœrulea</i> . Sp. 24. Granadilla pentaphyllos flore cœruleo magno.	-	35
124 ♀ * PASSIFLORA <i>digitata</i> . Sp. 25. Clematis Indica polyphyla major, flore clavato fructu Colocynthidis.	-	-
125 ♀ PHLOMIS <i>fructicosa</i> . Sp. 1. fol. 818. Phlomis Cretica, fructicosa, folio subrotundo, flore luteo. Verbasum.	-	45
126 ♀ PHLOMIS <i>Lychnidis</i> . Sp. 4. Verbasum angustis salviæ foliis.	-	30



Nro

- 117 Die amerikanische Passionsblume mit länglichen Blättern, und ins röthliche spielenden großen prächtigen Blumen.
- 118 Die Passionsblume mit zweihörnigen Blättern und weißen Blumen. Die Fledermausblume.
- 119 Die rankende Passionsblume mit dretheiligen Blättern, und kleinen gelben Blumen.
- 120 Die epheublättrige Passionsblume von Curacao, mit der kleinsten gelben Blume.
- 121 Passionsblume mit spontonförmig zugespitztem Blatt, und gelb und purpurroth schattirten Blumen.
- 122 Die kleinste Passionsblume von der Insel Dominique mit den allerkleinsten gelben Blumen.
- 123 Große blaue Passionsblume, ist die höchste, dauerhafteste und bekannteste.
- 124 Passionsblume von der Insel Martinique mit handförmigem Blatt, und großen gelben Blumen.
- 125 Der breitblättrige unächte Salbenstrauch mit gelben Blumen, und wolligen grauen Blättern.
- 126 Der kleine schmalblättrige unächte Salbenstrauch.

Nro *		Q	A.	tr.
127	♀ PHLOMIS <i>Leonurus</i> Sp. 12. Leonurus africanus, capitis bonæ spei.	-	-	45
128	♂ PHYLICA <i>Ericoides</i> . Sp. 1. fol. 283 Alateanus africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus muscosis.	-	-	35
129	♂ PHYLLIS <i>nobla</i> . Sp. 1. fol. 335 Bupleuroides quæ arbor umbellifera.	-	-	45
130	♀ PHYSALIS <i>somnifera</i> . Sp. 1. fol. 261. Alkekengi fructu parvo verticilato.	-	-	35
131	♀ PLUMBAGO <i>Zeylanica</i> . Sp. 1 fol. 215. Lyclinis Zeylanica spicata, ocymastri foliis, fructibus cappaceis oblongis, radice urente.	-	-	35
132	✓ POLIPODIUM <i>aureum</i> . Sp. 23. fol. 1546. Polipodium altissimum.	-	-	40
133	♀ POTERIUM <i>spinosum</i> . Sp. 3. fol. 1412. Pimpinella spinosa.	-	-	44
134	♀ PSORALEA <i>pinata</i> . Sp. 1. fol. 1074. Barba Jovis africana, foliis viridibus pinatis.	-	-	50
135	♀ PSORALEA <i>bituminosa</i> . Sp. 6. Trifolium bituminosum.	-	-	50
136	♂ PUNICA <i>granatum</i> . Sp. 1. fol. 676. Malus punica fativa.	-	-	25
137	♂ PUNICA flore pleno. β. Balauſtia flore pleno major.	-	-	48
138	♂ PRUNUS <i>lauro Cerasus</i> . Sp. 5. fol. 678 Cerasus folio laurino.	-	-	25
139	♂ RHAMNUS <i>alaternus</i> . Sp. 9. fol. 281. Alaternus, Phylica arbor.	-	-	35
	♂ a. Rhamnus alaternus foliis ex aureis maculatis.	-	-	45

♂ b. Rham-



Nro

- 127 Der große afrikanische Löwenschwanz mit
scharlachrothen Blumen.
- 128 Capischer Hendebaum, mit zarten weißen
Blumenbüscheln.
- 129 Unächter Canarischer Baum, Sesselstrauch.
- 130 Judenkirsche mit kleiner in Wirteln wach-
senden Frucht.
- 131 Ostindisches Bleikraut, oder Brennkraut.
- 132 Engelsfuß, oder Steinwurz aus Wales mit
zerfetzten Blättern.
- 133 Immergrünender dorniger Pimpinellen-
strauch, die stachelichte Pimpinelle.
- 134 Afrikanischer staudiger unächter Ginster mit
rothen Blumen.
- 135 Der staudige schmalblättrige Harzflor.
- 136 Gemeiner Granatenbaum.
- 137 Derselbe mit gefüllten Blumen.
- 138 Der Kirschlorbeerbaum, der Laurusbaum.
- 139 Die gemeine breitblättrige Steinlinde, Ma-
ternusbaum.
- a. - Maternus mit gelb makulirten Blättern.

Nro *

	Q	fl.	fr.
2 b. Rhamnus alaternus foliis argenteis maculatis.	-	1	45
2 c. Rhamnus alaternus latifolius.	-	-	45
2 d. Rhamnus alaternus angusti & serrati folio.	-	-	30
140 ♂ RHAMNUS paliurus. Sp. 12 Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso.	-	-	20
141 RHAMNUS lotus. Sp. 13. Zizyphus sylvestris.	-	-	25
142 ♀ RIVINIA humilis. Sp. 1. fol. 177. Rivinia humilis racemosa baccis puniceis.	-	-	24
143 ♀ RIVINIA canescens. Sp. B. Solanum barbadense racemosum minus tinctorium.	-	-	25
144 ROSA umbellata flore albo pleno.	-	1	-
145 ♂ ROSMARINUS officinalis. Sp. 1. fol. 33. Rosmarinus hortensis latiore folio.	-	-	10
b. Rosmarinus hortensis angustiore folio.	-	-	8
146 ♂ ROSMARINUS officinalis foliis aureis maculatis.	-	-	20
147 ♀ RUMEX lunaria. Sp. 15. fol. 479. Acetosa arborescens, subrotundo folio.	-	-	36
148 ♀ RUSCUS aculeatus. Sp. 1. fol. 1474. Ruscus aculeatus myrtifolius.	-	-	15
149 ♀ RUSCUS hypophyllum. Sp. 2. Laurus alexandrina, fructu folio infidente.	-	-	15

b. Alaternus mit weiß makulirten Blättern.

c. Breitblättriger Alaternus.

d. Schmalblättriger Alaternus mit ganz gespißten Blättern.

140 Christdorn, Judendorn.

141 Gemeiner zahmer Brustbeerbaum, der Zisolabaum, Zieserleinbaum.

142 Die kleine glattblättrige Rivia.

143 Die rauhblättrige Rivia mit rothen Johannisbeeren, Traubeln.

144 Die weiße immergrünende Boquet - oder Büschelrose.

145 Gemeiner breitblättriger Rosmarin.

b. Gemeiner schmalblättriger Rosmarin.

146 Rosmarin mit gelb makulirten Blättern.

147 Sauerampferbaum, oder Strauch aus den Canarischen Inseln.

148 Stachelichter gemeiner Mäusedorn, mit kleinen Myrten Blättern.

149 Lang - und großblättriger Mäusedorn, dessen Früchte hart auf den Blättern sitzen.

Nro *

	Q.	fl.	fr.
150 ♀ <i>RUSCUS racemosus</i> . Sp. 5. Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis insidente.	-	-	12
151 ♂* <i>SACCHARUM officinarum</i> . Sp. 1. fol. 79. Arundo saccharifera.	-	1	30
152 ♀ <i>SANTOLINA chamae Cyparissus</i> . Sp. 1. fol. 1179. Abrotanum femina vulgare.	-	-	45
153 ♀ <i>SEMPERVIVUM arboreum</i> . Sp. 1. fol. 664. Sedum majus arboreescens.	-	-	12
154 ♀ <i>SEMPERVIVUM arboreum</i> foliis macu- latis. B.	-	-	55
155 ♂ <i>SIDERITIS Canariensis</i> . Sp. 1. fol. 801. Stachys Canariensis frutescens, Ver- basci folio.	-	-	45
156 ♂ <i>SOLANUM pseudo capsicum</i> . Sp. 3. fol. 263. Solanum frutescens, fructu coccineo & luteo.	-	-	20
157 ♀ <i>SOLANUM radicans</i> . Sp. 7. Solanum americanum scandens & fru- tescens, flore magno cœruleo, fructu rubro.	-	-	35
158 ♀ <i>SOLANUM sodomœum</i> . Sp. 25. Solanum pomiferum frutescens spino- sum flore boraginis, foliis profunde laciniatis.	-	-	20
159 ♂ <i>SOLANUM tomentosum</i> . Sp. 27. Solanum spinosum, maxime tomento- sum.	-	-	25
160 ♂ <i>SPARTIUM Junceum</i> . Sp. 2. fol. 995. Genista hispanica Juncea.	-	-	15
161 ♂ <i>SPARTUM Junceum</i> flore pleno. Genista flore pleno luteo odoratissimo.	-	1	30



Nro

- 150 Der staudige alexandrinische Lorbeer, welcher seine rothe runde Früchte auf den äußersten Zweigen bringt.
- 151 Das Zuckerrohr, aus dessen Saft das Zucker gekottet wird.
- 152 Gemeines weißes Enpressenkraut.
- 153 Die größte Baumhauswurz, das baumartige Sedum.
- 154 Die große Baumhauswurz, mit grün, gelb und weiß maulirten Blättern.
- 155 Der hochstaudige unächte Canarische Andorn mit weißen, weichen, wolligen Blättern.
- 156 Der Korallenbaum, mit rothen oder gelben Früchten.
- 157 Staudenartiger kriechender amerikanischer Nachtschatten mit kleiner blauer Blume, und rothen Beeren.
- 158 Staudenartiger afrikanischer Nachtschatten, mit schwarzen Dornen, insgemein der Liebesapfel.
- 159 Der dornigste Nachtschatten, dessen Blätter mit feiner Wolle umzogen sind.
- 160 Gelber spanischer Genester, Günstler.
- 161 Gefüllter gelber spanischer Genester.
- f 3. 162. Ge


Nro *


	Q	l	tr.
162 ♀ STATICE <i>Limonium</i> . Sp. 2. fol. 394. Limonium maritimum majus.	-	-	45
163 ♂ TARCHONANTHUS <i>camphoratus</i> . Sp. 1. fol. 1179. Elychryso affinis africana arbor.	-	-	55
164 ♀ TEUCRIUM <i>Marum</i> . Sp. 12. fol. 788. Marum Creticum vel Syriacum, vulgo Marum verum.	-	-	24
165 ♀ TEUCRIUM <i>Regium</i> , vulgo Syriacum.	-	-	15
166 4 THEOBROMA <i>angusta</i> . Müll. fol. 1100. Species nova.	-	1	30
167 ♀ TRACHELIUM <i>cæruleum</i> . Sp. 1. fol. 243 Trachelium faturatum umbellatum.	-	-	15
168 ♀ TROPEOLUM <i>minus</i> flore pleno. Cardamindum minus flore pleno.	-	-	30
169 * TURNERA <i>ulmifolia</i> . Sp. 1. fol. 387. Cytisus urticae folio, flore luteo, fasciculis trigonis.	-	-	30
170 4 VIBURNUM <i>tinus</i> . Sp. 1. fol. 383. Laurus tinus sive sylvestris.	-	-	30
171 ♀ * VINCA <i>rosea</i> . Sp. 4. fol. 305. Vinca foliis oblongis ovatis integerimis, tubo floris longissimo.	-	-	24
172 4 VITEX <i>agnus castus</i> . Sp. 1. fol. 890. Vitex foliis digitatis serratis, spicis verticillatis.	-	-	25
173 WACHENDORFIA <i>thyrsiflora</i> . Sp. 1. fol. 59. Wachendorfia foliis lanceolatis quinquenerviis, floribus in thyrsum collectis.	-	1	-



Nro

- 162 Gemeiner großer unächter Meerlavendel mit breiten Blättern.
- 163 Der ostindische oder afrikanische unächte Salbenbaum.
- 164 Das stark riechende Marum verum, oder Ragenkraut.
- 165 Syrisches größeres Ragenkraut ohne Geruch.
- 166 Der Guazumabaum mit dem Usmenblatt, und schwarzer purpurrother Frucht.
- 167 Blaues morgenländisches Halskraut, mit großen Blumensträußen.
- 168 Kleine türkische Blumenkresse mit gefüllten Blumen.
- 169 Das amerikanische gelbe Eistenröslein, insgemein die gelbe Vinca turnera.
- 170 Der Zinuslorbeer mit weißen häufigen Blumen, insgemein Laurus tinus.
- 171 Das ostindische, staudige, und großblumige immerblühende Sinngrün, insgemein Vinca per Vinca.
- 172 Abrahamsbaum, Keuschbaum, Mönchs-Pfefferbaum genannt.
- 173 Die Wachendorfia mit schönen gelben Blumensträußen.





Viertes

Ein - und ausländische
welche in der Freye unserer ordinari




Nro	Δ	℥	℔	Gr.
	Abies. suche Pinus.	-	-	
	Acacia. suche Robinia, Gleditsia, und Mimosa.	-	-	
1	℥ ACER <i>pseudo platanus</i> . Sp. 1. fol. 1495. Acer majus multis falso platanus.	-	-	12
2	℥ ACER <i>pseudo platanus</i> foliis eleganter variegatis.	-	-	24
3	℥ ACER <i>campestre</i> . Sp. 7. Acer <i>campestre</i> & minus.	-	-	12
4	℥ ACER <i>rubrum</i> . Sp. 3. Acer <i>rubrum</i> Virginianum.	-	-	24
5	℥ ACER <i>Negundo</i> . Sp. 10. Acer maximum foliis trifidis quinquefidis Virginianum.	-	-	24
6	℥ ACER <i>pensylvanicum</i> . Sp. 6. Acer montanum candidum.	-	-	30
7	℥ ACER <i>striatum</i> . Münch.	-	-	30
8	℥ ACER <i>tartaricum</i> . Sp. 1. Acer foliis oblongo cordatis inaequaliter ferratis.	-	-	35
9	℥ ACER <i>Monspessulanum</i> . Sp. 8. Acer trifolium.	-	-	

10 ℥ Aef-




Verzeichniß.

Gehölze,
Winter aushalten.



Nro :

- 1 Der gemeine Ahorn, Urse, Breitblatt, die Buch - oder Waldesche.
- 2 Ahorn mit gelb und grün makulirten Blättern, eine Abartung.
- 3 Weißeper, Heckenahorn, Binbaum, Nafshol-
der, Wasserhülßen, Speck - Stockholz, Bie-
nenbaum.
- 4 Rothblühender virginischer Ahorn.
- 5 Ahorn mit dem Eschenblatt aus Virginien.
- 6 Amerikanischer Bergahorn.
- 7 Pensilvanisch gestreifter Ahorn.
- 8 Tartarischer Ahorn.
- 9 Ahorn von Montpellier.



Nro Δ		Q	fl.	lt.
10	♂ AEscULUS <i>Hippocastanum</i> . Sp. 1. fol. 488. Castanea folio multifido.	-	-	8
11	♂ Aesculus foliis ex albo & viridi variegatis.	-	-	.
12	4 AEscULUS <i>pavia</i> . Sp. 2. Pavia flore rubro.	-	-	25
13	♂ AEscULUS <i>pavia</i> flore luteo. Alaternus. siehe unter Glashaus-Gewächsen Rhamnus.	-	-	25
14	4 AMORPHA <i>fructicosa</i> . Sp. 1. fol. 1003. Barba Jovis americana.	-	-	18
15	♂ AMORPHA <i>fructicosa</i> . foliis variegatis.	-	-	20
16	♂ AMYGDALUS <i>communis</i> . Sp. 2. fol. 676. ♂ Amygdalus communis sativa flore pleno.	-	-	25
17	4 AMYGDALUS <i>orientalis</i> . Haus vat. Amygdalus orientalis foliis argenteis splendidis.	-	-	40
18	♂ AMYGDALUS <i>pumila</i> . Haus vat. Amygdalus Indica nana.	-	-	25
19	♂ AMYGDALUS <i>nana</i> flore pleno. Sp. 3. Andromeda. siehe unter Glashaus-Gewächsen.	-	-	30
20	4 * ARALIA <i>spinosa</i> . Sp. 2. fol. 392. Angelica arborescens spinosa.	-	2	-
21	♂ * ARBUTUS <i>andraceae</i> Sp. 2. fol. 566. Arbutus folio non serrato. Bastaria. siehe Calicantus.	-	3	-
22	♂ BERBERIS <i>vulgaris</i> . Sp. 1. fol. 471. Berberis spinis triplicibus.	-	-	10




Nro

- 10 Gemeine wilde Kastanie, Roskastanie, Maronenbaum.
- 11 Gemeine wilde Kastanie mit makulirtem Laub.
- 12 Rothblühende Roskastanie.
- 13 Roskastanie mit gelben Blumen, mit einer geringen Bedeckung vertragen solche unsere gelinde Winter.
- 14 Bastardindig, Jupiters Bart.
- 15 Jupiters Bart mit gestreiften Blättern.
- 16 Mandelbaum mit seinen Abartungen. s. Pomona Franc. I. Th. Der gefüllte Mandelbaum.
- 17 Orientalischer Mandelbaum mit weiß und grün gefleckten glänzenden Blättern von Aleppo.
- 18 Zwerg-Mandelbaum mit rothen einfachen Blumen.
- 19 Gefüllter Zwerg-Mandelbaum.
- 20 Die staudige Angelica.
- 21 Der Erdbeerbaum.
- 22 Berberitzenstaude, Verbisbeeren, Nesselbeeren, Sauerdorn, Weinschößling, Weinnäselein, Esigdorn, Eibseln.

Nro Δ

	Q	fl	fr.
23 ♂ BERBERIS <i>Canadensis</i> . Haus vatt.	-	-	15
24 ♀ BETULA <i>alba</i> . Sp. 1. fol. 1393. Betula foliis cordatis ferratis.	-	-	12
25 ♀ BETULA <i>nigra</i> . Sp. 2. Betula nigra Virginiana.	-	-	15
26 ♀ BETULA <i>lenta</i> . Sp. 3.	-	-	
27 ♂ BETULA <i>nana</i> . Sp. 4.	-	-	
28 ♂ BETULA <i>pumila</i> . Haus vatt.	-	-	15
29 ♀ BETULA <i>alnus</i> . Sp. 5.	-	-	
30 ♀ BIGNONIA <i>radicans</i> . Sp. 13. fol. 868. Bignonia americana fraxinifolio, flore amplo phæniceo...	-	-	25
31 ♀ BIGNONIA <i>Catalpha</i> . Sp. 1. Bignonia foliis simplicibus cordatis. Bublerum. siehe unter Glashaus- Gewächsen.	-	-	35
32 ♀ BUXUS <i>sempervirens</i> . Sp. 1. fol. 1394.	-	-	4
33 a. 4 BUXUS <i>arborescens</i> . Müll.	-	-	20
b. 4 Buxus foliis ex luteo variegatis.			30
c. 4 Buxus foliis ex albo variegatis.			30
34 ♂ * CALICANTHUS <i>floridus</i> . Sp. 1. fol. 718. Basteria frutex corni.	-	-	30
35 ♀ * CALLICARPA <i>americana</i> . Sp. 1. fol. 161. Johnsonia americana.	-	-	
36 a. 4 CARPINUS <i>betulus vulgaris</i> . Sp. 1. fol. 1416.	-	-	8
b. 4 Carpinus foliis variegatis.			
37 ♀ CASSIA <i>marilandica</i> Sp. 20. fol. 537. Cassia minoræ foliis, siliqua hirsuta. Castanea. siehe Fagus.	-	-	35
38 ♂ Cea-			



Nro

- 23 Die Canadische Berberitze.
- 24 Die gemeine Birke, Man-oder Bonnebaum.
- 25 Die schwarze virginische Birke.
- 26 Canadische Birke.
- 27 Zwergbirke.
- 28 Amerikanische Zwergbirke.
- 29 Die gemeine weiße Eller, Erle, mit ovalen Schuppen, Otterbaum, wächst an Bächen.
- 30 Die hochsteigende Trompetenstaude, mit schönen scharlachrothen Blumen.
- 31 Der große Trompetenbaum, insgemein Catalpa.
- 32 Der kleine staudige Buxbaum zu Einfassungen.
- 33 Der baumartige Buxbaum.
 - b. Gelb makulirter Buxbaum.
 - c. Weiß makulirter Buxbaum.
- 34 Der Carolinische Gewürzbaum, insgemein der Specerenpfeffer genannt.
- 35 Die staudenartige Johnsonia, der rothe Perlenbeer- oder Nesselstrauch.
- 36 Gemeine Heimbuche, Weißbuche, Steinbuche.
 - b. Weißbuche mit makulirtem Laub.
- 37 Mariländische Sennerstaude mit gelben Blumen.

38. Der

Nro Δ

	Q.	fl.	fr.
38 ♂ CEANOTHUS <i>americanus</i> . Sp. 1. fol. 284. Evonymus novi belgii, corni foeminae foliis.	-	-	
39 ♀ CELASTRUS <i>scandens</i> . Sp. 2. fol. 285. Evonymoides canadensis scandens.	-	-	24
40 ♂ CELTIS <i>australis</i> . Sp. 1. fol. 1478. Celtis fructu nigricante.	-	-	35
41 ♂ * CELTIS <i>orientalis</i> . Sp. 2. Ulmus fructu baccato.	-	-	40
42 ♂ * CELTIS <i>occidentalis</i> . Sp. 3. Celtis fructu obscure purpurascente.	-	-	45
43 ♂ * CEPHALANTUS <i>occidentalis</i> Sp. 1. fol. 138. Scabiosa dendroides americana.	-	-	-
Cerasus. siehe Prunus.			
Ceratonia. siehe unter Glashaus - Ge- wächsen.			
44 ♀ * CERCIS <i>siliquastrum</i> . Sp. 1. fol. 534. Siliquastrum arbor Judae flore rubro.	-	-	24
b. ♀ * Cercis <i>siliquastrum</i> flore albo.	-	-	30
45 ♀ * CHIONANTHUS <i>Virginica</i> . Sp. 1. fol. 11. Amelanchier Virginiana lauro cerasi fo- lio.	-	-	36
Cistus. siehe unter Glashaus - Gewäch- sen.			
46 ♀ CLEMATIS <i>italica</i> . Sp. 8. fol. 765. Clematis latifolia integra.	-	-	8
47 ♀ CLEMATIS <i>viticella</i> . Sp. 1. Clematis viticella <u>flore caeruleo sim-</u> <u>plici.</u>	-	-	19

48 ♀ Cle-

No 1

38 Der glatte Celasterbaum, Hundsbeerbaum,
Thee aus Neu jersey.

39 Kletternder Spindelbaum, Baummörder.

40 Der Zürgel- oder Lotusbaum, Nesselbaum.

41 Orientalischer gelbbeerichter Zürgelbaum.

42 Virginischer rothbeerichter Zürgelbaum.

43 Der Knopfbaum.

44 Der Judasbaum mit rothen Blumen.

b. Der Judasbaum mit weißen Blumen.

45 Schneeflocken, oder Schneetröpflein-Baum.

46 Baldrebe, Klenen, Hexenstrang, Hurenstrang,
auch zuweilen der Teufelszwirn genannt.

47 Blaue virginische Baldrebe mit blauen ein-
fachen Blumen.

Nro Δ

	Q.	H.	ft.
48 ♀ CLEMATIS <i>viorna</i> . Sp. 2. Clematis purpurea repens.	-	-	
49 ♀ CLEMATIS <i>flamula</i> . Sp. 9. Clematis five flamula repens.	-	-	20
50 ♂ CLEMATIS <i>recta</i> . Sp. 11. Clematis five flamula surecta.	-	-	20
51 ♂* CLETHRA <i>alnifolia</i> . Sp. 1. fol. 566. Alnifolia americana serrata.	-	-	10
52 24 COLUTEA <i>arborescens</i> . Sp. 1. fol. 1045. Colutea vesicaria.	-	-	10
53 b. ♂ COLUTEA <i>orientalis</i> . β. Colutea orientalis flore sanguineo maculis luteis notata.	-	-	15
54 c. ♂ COLUTEA <i>istria</i> . Haus vat.	-	-	15
55 ♂ CORNUS <i>sanguinea</i> . Sp. 3. fol. 171. Virga sanguinea.	-	-	15
56 ♂ CORNUS <i>florida</i> . Sp. 1. Cornus mas Virginiana.	-	-	15
57 ♂ CORNUS <i>alba</i> . Haus vatt.	-	-	10
58 24 CORNUS <i>mascula</i> . Sp. 2. Cornus hortensis mas.	-	-	8
59 ♂ CORNUS <i>fœmina</i> . Haus vatt. Cornus fœmina Virginiana angustiore folio.	-	-	8
60 ♀ CORONILLA <i>Emerus</i> . Sp. 1. fol. 1046. Colutea scorpioides.	-	-	16
61 ♀ CORONILLA <i>valentina</i> . Sp. 3. Poligala valentina.	-	-	18



Red

- 48 Niedrige kriechende purpurrothe Waldrebe.
- 49 Kriechende Waldrebe mit weiß gelblichten Blumen.
- 50 Die gerade stehende weiße Waldrebe, Brenns-
kraut, Brennwurzel, Blatterzug.
- 51 Amerikanische Clethra-Staude mit Erlenblatt,
und weißen Blumen.
- 52 Der gemeine Blasenbaum.
- 53 Staudenartiges Blasenfenne mit rothen in
das gelbe spielenden Blumen.
- 54 Staudenartiges Blasenfenne mit gelben Blum-
men.
- 55 Hartriegel, Härtern, Hartreder, Heckenbaum,
Hundsbeer, Rothbeinholz.
- 56 Amerikanischer immer blühender Hartriegel
mit blauen Beeren.
- 57 Wilde Hundsbeeren mit einer weißen Frucht,
Tartarischer Hartriegel.
- 58 Carnelfirsche, Cornelifirsche, Cornelibzere,
Dierlißen, Dierleinbaum, wälsche Kirschen,
Hornkirschen.
- 59 Virginischer Hartriegel mit schmalen Blät-
tern und weißen Beeren.
- 60 Scorpionsfenne, Beilkraut mit gelben häufigen
Blumen, eine schöne niedrige Staude.
- 61 Beilkraut mit wohlriechenden gelben Blumen.

Nro Δ

62 4 CORYLUS avellina. Sp. 1. fol. 1417.
Corylus sylvestris.

63 4 CORYLUS colurna. Sp. 2.
Corylus Byzantina.

Cotynus. siehe Rhus.

64 4 CRATÆGUS oxiacantha. flore pleno. Sp.
β. fol. 681.
Mespilus apifolio sylvestris spinosa.

♂ 65 CRATÆGUS azarolus. Sp. 9.
Mespilus apifolio laciniato.

66 4 CRATÆGUS torminalis. Sp. 2.
Cratægus folio laciniato.

67 4 CRATÆGUS coccinea. Sp. 3.
Mespilus Virginiana, colore rutilo.

68 4 CRATÆGUS Crus galli Sp. 4.
Mespilus pruni foliis, spinis longissimis
fortibus, fructu rubro magno.

69 4 CRATÆGUS uniflora. Hausvatt.


70 4 CRATÆGUS Aria. Sp. 1.
vulgo Aria Theophrasti.

Cupressus. siehe unter Glashaus - Ge-
wächsen.

Cydonia. siehe Pyrus.

71 ♂ CYTISUS laburnum. Sp. 1. fol. 1041.
Cytisus alpinus latifolius, flore race-
moso pendulo.

72 ♂ Cy.



Nro

- 62 Gemeine Haselnußstaude, Waldnüsse.
- 63 Die byzantinische Nuß, insgemein die Bart- oder Zellernuß genannt.
- 64 Weißdorn, Hagedorn, Mehldorn, mit gesüllter Blüthe.
- 65 Der weiße amerikanische Azarollenapfel.
- 66 Elsbeeren, Euerlingsbirnbaum, Elschbirle, zahmer Vogelbeerbaum.
- 67 Hagedorn mit den größten Weinblättern und großen rothen Früchten.
- 68 Hagedorn mit großen rothen Früchten, und dunkelgrünen stark gerippten, vornen runden gegen den Stiel zugespizten Blättern.
- 69 Hagedorn mit glänzenden grünen Johannisbeerblättern, langen einzelnen Stacheln, und größeren ganz gelben Früchten.
- 70 Mehlbeerenbaum, Mehlbierle, Mehlfässerchen, Meerfirschbaum, Arlasbaum, Spirlingbaum, hat große oben grüne, unten mehliche Blätter, den Wasserholder gleichend, mit rothen kleinen runden eßbaren Früchten.
- 71 Der große Bohnenbaum, Markweide, mit breitem Blatt, unächtes Ebenholz.

Nro Δ

	Q	fl.	fr.
72 ♂ <i>CYTISUS alpinus</i> . Haus vatt.	-	-	15
73 ♂ <i>CYTISUS nigricans</i> . Sp. 2. Cytifus glaber nigricans.	-	-	20
74 ♀ <i>CYTISUS sessilifolius</i> . Sp. 3. Cytifus glaber filiqua lata.	-	-	15
75 ♀ <i>DAPHNE mezereum</i> . Sp. 1. fol. 509. Thymelea laurifolio deciduo flore purpureo.	-	-	10
76 ♀ <i>DAPHNE laureola</i> . Sp. 6. Thymelea laurifolio sempervirens seu laureola mas.	-	-	25
77 ♀ <i>DAPHNE Cneorum</i> . Sp. 9. Cneorum Matheoli. Diervilla. fuche Lonicera.	-	-	25
78 ♂ <i>DIOSPYROS virginiana</i> . Sp. 2. fol. 1510. Guajacana loto arbori affinis, Virginiana Pischamia dicta. Dracocephalum. fuche unter Glaszhaus-Gewächsen.	-	-	20
79 ♀ <i>ELEAGNUS angustifolia</i> . Sp. 1. fol. 176. Eleagnus inermis. vulgo Oliva Bohemica. Emerus. fuche Coronilla.	-	-	24
80 ♂ <i>EVONYMUS europæus</i> . Sp. 1. fol. 286. Evonymus vulgaris.	-	-	6
81 b. ♂ <i>Evonymus europæus</i> foliis variegatis.	-	-	16
82 c. ♂ <i>Evonymus latifolius</i> .	-	-	10
83 d. ♂ <i>Evonymus pannonicus</i> . Haus vatt.	-	-	12



Nro

- 72 Der schmalblättrige Bohnenbaum.
- 73 Der schwarze Geisklee.
- 74 Der Geiskleestrauch mit kurzen Stielen und gelber Blüte.
- 75 Kellerhals, Seidelbast, ist hiesiger Gegend in buschichten Wäldern anzutreffen.
- 76 Immergrünende ganz niedrige Kellerhalsstaude mit größern Blättern.
- 77 Steinrösleinstrauch in Deutschland.
- 78 Die amerikanische Dattelpflaume, insgemein Pischaminpflaume genannt.
- 79 Wilder Ölbaum, böhmischer Ölbaum, von den Portugiesen wegen des angenehmen starken Geruchs der Paradiesbaum genant.
- 80 Gemeiner Spindelbaum, Spielbaum, Pfaffenhüttlein, Pfaffenköpflein, Pfaffenmütze, Zwickholz.
- 81 Gemeiner Spindelbaum mit weiß und grün marmulirten Blättern.
- 82 Breitblättriger Spindelbaum.
- 83 Orientalischer Spindelbaum, dessen Blätter gegen Herbst ganz roth werden, mit einer rauhen warzigen Borke.

Nro Δ

	Q	f.	u.
84 h FAGUS <i>sylvatica</i> . Sp. 3. fol. 1416. Fagus.	-	-	8
85 h FAGUS <i>castanea</i> . Sp. 1. Castanea sativa.	-	-	45
86 ♀ FAGUS <i>castanea pumila</i> . Sp. 2. Ficus Carica. suche unter Glashaus-Ge- wächsen. Frangula. suche Rhamnus.	-	-	-
87 h FRAXINUS <i>excelsior</i> . Sp. 1. fol. 1509. Fraxinus floribus nudis.	-	-	8
88 b. h FRAXINUS <i>humilior</i> minori & tenuio- rifolio. Haus vatt.	-	-	20
89 h FRAXINUS <i>ornus</i> . Sp. 2. Fraxinus paniculata.	-	-	24
90 b. h FRAXINUS <i>rotundifolia</i> . Haus vatt.	-	-	-
91 h FRAXINUS <i>americana</i> . Sp. 3. Fraxinus Carolinensis, foliis angustio- ribus utrimque acuminatis pendulis.	-	-	20
92 ♂ GENISTA <i>pilosa</i> . Sp. 9. fol. 997. Genista ramosa foliis hyperici.	-	-	15
93 ♂ GENISTA <i>lusitanica</i> . Sp. 14. Genista spartium spinosum minus.	-	-	15
94 ♀ GENISTA <i>sagittalis</i> . Sp. 4. Chamae genista sagittalis.	-	-	-
95 2 GINGO <i>biloba</i> Mantis. Gingo foliis bilobis. Species nova.	-	2	20
96 h GLEDITSIA <i>triacanthos</i> . Sp. 1. fol. 1509. Acacia americana abruæ folio Tria- canthos. Grossularia. suche Ribes.	-	-	45

84 Der gemeine Buchbaum, rothe Buche, trägt
ge Buche.

85 Der süße Kastanienbaum mit stachelichten
Früchten.

86 Die süße Zwergkastanie.

87 Die gemeine Esche, Asche, Äschbaum, Stein-
eschern, Bundholzbaum.

88 Esche von Montpellier.

89 Die blühende Esche, die Blumen tragende
Esche, mit weißer Blüthe.

90 Esche mit einem runden Blatt, die Mannas-
esche genannt.

91 Die Carolinische Esche, die weiße Esche mit
breitem Laub.

92 Ästiger Ginster mit Johanniskraut-Blättern.

93 Portugiesischer Ginster.

94 Zwerg - ankerförmiger Ginster.

95 Der amerikanische Löffelbaum mit zürgekrum-
den mitten getheilten Blättern, ein ganz
neuer Baum.

96 Dornstacheliger amerikanischer Schottens-
dorn, Heuschreckenbaum, Christdorn, Ho-
nigdorn.

Nro Δ

	Q.	fl.	fr.
97 ♂ <i>GUILANDINA Diocia. Sp. 5. fol. 545.</i> Bonduc Canadense.	-	1	36
98 ♀ <i>HEDERA Helix. Sp. 1. fol. 292.</i> Hedera communis major.	-	-	-
99 ♀ <i>HEDERA quinquefolia. Sp. 2.</i> Vitis quinquefolia Canadensis scan- dens.	-	-	10
Hibiscus. siehe unter Glashaus-Gewäch- sen.			
100 ♀ <i>HIPPOPHAE Rhamnoides. Sp. 1. fol.</i> 1425. Rhamnoides salici folio.	-	-	15
101 ♀ <i>HYDRANGEA arborescens. Sp. 1. fol.</i> 568.	-	-	35
102 ♀ <i>HYPERICUM androsæmum. Sp. 5. fol.</i> 1101. Androsæmum maximum fructicosum.	-	-	12
103 ♀ <i>HYPERICUM hircinum. Sp. 9.</i> Hypericum foetidum frutescens minus.	-	-	12
104 ♀ <i>HYPERICUM Canariense. Sp. 8.</i> Hypericum frutescens Canariense mul- tistorum.	-	-	12
105 ♀ <i>HYPERICUM ascyrum Sp. 4.</i> Ascyrum magno flore.	-	-	15
106 ♀ <i>HYPERICUM kalmianum. Sp. 2.</i>	-	-	15
107 ♀ <i>JASMINUM officinale. Sp. 1. fol. 9.</i> Jasminum vulgare flore albo.	-	-	20
108 ♂ <i>JASMINUM fructicans. Sp. 4.</i> Jasminum luteum vulgo bacciferum dictum.	-	-	10




Nro

- 97 Schußerbaum, oder Schnellkäulgen mit sehr großen Blättern.
- 98 Epheu, Waldeppich, Mauerpfaue, Baumwinde, Ivenblätter, Wintergrün, Klinop.
- 99 Jungfernwein, Vigne vierge genannt, fünfblättriger wilder Weinstock.
- 100 Meerkreuzdorn, Weibendorn, Sanddorn, schmaler weidenblättriger Stehdorn.
- 101 Niedriger amerikanischer Wasserstrauch, welcher alle Winter seine Stängel abwirft, und einen feuchten Grund liebt.
- 102 Breitblättriges Beeren tragendes Johannis kraut, Harthen, Cunrad, Grundheil.
- 103 Stinkendes Johanniskraut.
- 104 Staudenartiges canarisches Johannis kraut.
- 105 Immergrünendes Harthen, mit großen Blumen.
- 106 Amerikanisches weichblättriges Johanniskraut.
- 107 Gemeiner weißer Jasmin, Welschmin, Kandelblüthe.
- 108 Der hohe gelbe Beeren tragende Jasmin ohne Geruch.

Nro Δ

	Q.	fl.	fr.
109 ♀ JASMINUM <i>humile</i> . Sp. 5. Jasminum humile luteum.	-	-	15
Die übrigen sind zart, gehören unter die Glashaus-Gewächse.			
110 ♂ ILEX <i>aquifolium</i> . Sp. 1. fol. 181. Ilex aquifolium vulgo agrifolium.	-	-	30
111 b. 24 * ILEX <i>aquifolium</i> foliis ex luteo va- riegatis.	-	1	50
Johnsonia. siehe Calicarpa.	-	-	.
112 ♂ JUGLANS <i>regia</i> . Sp. 1. fol. 1415. Nux juglans sive regia vulgaris.	-	-	15
113 ♂ JUGLANS <i>nigra</i> . Sp. 4. Nux juglans Virginiana nigra.	-	-	30
114 ♂ JUGLANS <i>alba</i> . Sp. 2. Nux juglans alba Virginiana.	-	-	30
115 ♂ JUGLANS <i>cinerea</i> . Sp. 3. Juglans oblonga.	-	-	35
116 ♂ JUNIPERUS <i>communis</i> . Sp. 1. fol. 1470. Juniperus communis fructicosa.	-	-	20
117 24 JUNIPERUS <i>suecica</i> . Müll. Juniperus vulgaris arbor.	-	-	24
118 24 JUNIPERUS <i>Virginiana</i> . Sp. 8. Juniperus Virginiana folio ubique ju- niperino.	-	-	36
119 24 JUNIPERUS <i>Caroliniana</i> . Müll. Juniperus Virginiana foliis inferiori- bus juniperinis, superioribus Sabi- nam vel Cypressum referentibus.	-	-	30
120 24 JUNIPERUS <i>phænicea</i> . Sp. 5. Juniperus major.	-	1	-



Nro

109 Kleiner gelber italiänischer Jasmin.

110 Die gemeine Hülse, Stechpalmen, Stechbaum, Walddistel, Hülseholz, Stechlaub, Christdorn, Myrtendorn, Hilbusch.

111 Stechpalm mit gelb makulirten Blättern.

112 Wallnuß, die gemeinen wälschen Nüsse.

113 Schwarze amerikanische Wallnuß.

114 Heckerinuß mit weißen Früchten.

115 Lange amerikanische schwarze Wallnuß.

116 Gemeiner Wachholder, Kestholder, Kronet, Zachandelbaum, Kronvittstrauch.

117 Schwedischer Wachholderbaum, Wachholder.

118 Der rothe virginische Wachholder, insgemein die rothe Ceder.

119 Carolinische Ceder oder Wachholder.

120 Phönicische Ceder mit gelblichten Beeren.

121 Der

Nro Δ		Q	fl.	fr.
121	4 JUNIPERUS <i>sabina</i> . Sp. 9. Sabina foliis Tamarisci.	-	-	15
122	b. ♂ JUNIPERUS <i>sabina</i> foliis variegatis.	-	-	35
123	♀ * KALMIA <i>angustifolia</i> . Sp. 2. fol. 560. Chamae daphne sempervirens.	-	-	-
Laburnum. siehe Cytisus.				
Larix. siehe Pinus.				
124	✓ LAVANDULA <i>spica</i> . Sp. 1. fol. 800. Lavandula latifolia.	-	-	5
Lavatera. siehe unter Glashaus - Ge- wächsen.				
Laurus. siehe Glashaus - Gewächse.				
Lentiscus. siehe Pistacia.				
125	♂ LIGUSTRUM <i>vulgare</i> . Sp. 1. fol. 10. Ligustrum Germanicum.	-	-	5
126	b. ♂ LIGUSTRUM foliis ex luteo macu- latis.	-	-	15
127	♂ LIGUSTRUM <i>Italicum</i> . Haus vatt. Lilak. siehe Syringa.	-	-	12
128	4 LIQUIDAMBER <i>styraciflua</i> . Sp. 1. fol. 1418. Styrax aceris folio.	-	-	20
129	4 LIRIODENDRON <i>Tulipifera</i> . Sp. 1. fol. 755. Tulipifera arbor Virginiana.	-	2	30
130	♀ LONICERA <i>periclymenum</i> . germanicum. Sp. 3. fol. 246. Caprifolium germanicum, flore rubel- lo, serotinum.	-	-	6

131 b. ♀ Loni-



Nro

- 121 Der gemeine Sagebaum, Sevenbaum, Sadel, Roßschwanz, Siebenbaum.
- 122 Segelbaum mit makulirten Blättern.
- 123 Schmalblättriger immer grüner Löffelbaum, oder immer grüner Zwerglorbeerbaum.
- 124 Breitblättriger gemeiner Lavendel.
- 125 Hartriegel, Rheinweide, Beinholz, Mundholz, spanische Weide, Geishülsen, Beinshülsen, Kehlholz, grüner Faulbaum, Eisenbeerbaum.
- 126 Hartriegel mit gelb makulirten Blättern.
- 127 Immer grünende Rheinweide, Hartriegel.
- 128 Der Storaxbaum mit dem Ahornblatt.
- 129 Der Tulipenbaum.
- 130 Gemeines Geisblatt, Specklilien, Jerichorosen.

131 Geis

Nro *		Q	fl.	Fr.
131	b. ♀ LONICERA periclymenum foliis sinuatis.	-	-	8
132	♀ LONICERA periclymenum vulgare. Haus vatt.	-	-	6
133	♀ LONICERA periclymenum caprifolium italicum. Sp. 1.	-	-	8
134	b. ♀ LONICERA periclymenum foliis sinuatis & variegatis.	-	-	8
135	♀ LONICERA periclymenum sempervirens. Sp. 2.	-	-	12
136	♀ LONICERA periclymenum americanum. Haus vatt.	-	-	10
137	♀ LONICERA periclymenum racemosum. Haus vatt.	-	-	8
138	♀ LONICERA periclymenum Dioicum. Haus vatt.	-	-	10
139	♂ LONICERA xylosteum. Sp. 6. Chamae Cerasus Dumetorum.	-	-	12
140	♂ LONICERA alpigena. Sp. 8. Chamae Cerasus alpina.	-	-	8
141	♀ LONICERA symphoricarpos. Sp. 11. Symphoricarpos foliis alatis.	-	-	10
142	♂ LONICERA Diervilla. Sp. 12. vulgo Diervilla. Malus. siehe Pyrus. Magnolia. siehe Glashaus-Gewächse.	-	-	10
143	♀ MENISPERMUM Canadense. Sp. 1. fol. 1468. Menispermum Canadense scandens.	-	-	24

144 ♀ Meni-



Nro

- 131 Geißblatt mit den Eichenblättern.
- 132 Haariges gemeines Geißblatt, wächst hin und wieder in Hecken und Wäldern.
- 133 Durchgewachsenes Geißblatt, Rose von Jericho, je länger, je lieber.
- 134 Rose von Jericho mit gelb makulirten Blättern.
- 135 Immer grünes virginisches Geißblatt mit scharlachrothen Blumen ohne Geruch.
- 136 Immer grünes nordamerikanisches Geißblatt mit gelben Blumen, welche spät blühen.
- 137 Violetes lang blühendes Geißblatt mit schönen scharlachrothen gelblichten Beeren.
- 138 Jerichorosen, eine ganz neue Sorte, mit gelblichten kleinen Blumen.
- 139 Heckenkirsche, Wespertsman, Zaunkirsche, Waldrinde, Beinholzen, Zweckholz, Röhrholz, Tabakröhrchenholz, Hundsbäum, Schißbeer.
- 140 Heckenkirsche mit punctirten Beeren aus der Schweizer Alpen, Purgierkirsche.
- 141 Staudenartiges St. Peters Kraut.
- 142 Die staudige Diervilla.
- 143 Schlingendes Mondsaamenkraut, Canadischer Epheu.

144 Wir

Nro Δ	Q	fl.	tr.
144 ♀ MENISPERMUM <i>Virginicum</i> . Sp. 2. Menispermum folio herbaceo.	-	-	45
145 24 MESPILUS <i>germanica</i> . Sp. 1. fol. 684. Mespilus germanica, folio laurino non ferrato.	-	-	25
146 ♂ MESPILUS <i>pyracantha</i> . Sp. 2. Mespilus aculeata amygdali folio. le Buïsson ardent dictus.	-	-	15
147 ♂ MESPILUS <i>amelanchier</i> . Sp. 4. Mespilus folio rotundiori, fructu ni- gro subdulci.	-	-	20
148 ♂ MESPILUS <i>arbutifolia</i> . Sp. 3. Mespilus Virginiana arbutifolio.	-	-	15
149 ♂ MESPILUS <i>Cotoneaster</i> . Sp. 7. Mespilus folio subrotundo fructu ru- bro.	-	-	15
150 ♀ MORUS <i>nigra</i> . Sp. 2. fol. 1398. Morus fructu nigro.	-	-	25
151 ♀ MORUS <i>alba</i> . Sp. 1. Morus fructu albo.	-	-	15
152 24 MORUS <i>papyrifera</i> . Sp. 3. Morus papyrifera sativa Japonica.	-	-	45
153 ♂ MYRICA <i>cerifera</i> . Sp. 2. fol. 1453. Myrica foliis lanceolatis subserratis. fructu baccato.	-	-	20
154 ♀ OLEA <i>Europea</i> . Sp. 1. fol. 11. Olea Europea sativa.	-	-	55
155 ♀ ONONIS <i>fructicosa</i> . Sp. 15. fol. 1006. Ononis purpurea vera præcox fru- tescens flore rubro amplo.	-	-	35



Nro

- 144 Virginischer Epheu, Mondsaamenkraut.
- 145 Gemeine Nispeln, Nespeln, oder Nespelle.
Pom. Th. II.
- 146 Virginischer immer grüner Hagedorn, der
feurige Busch genant, wegen seinen häufigen
kleinen scharlachrothen Beeren.
- 147 Quandelbeerbaum Flühbirnlein mit schwar-
zen kleinen in Büscheln wachsenden Früch-
ten, französ. Alissier genannt.
- 148 Mespel mit unten etwas wollichten länglich-
ten Erdbeerbaum-Blättern, rothen lang-
lichten Früchten.
- 149 Zwergmispeln, Zwergquittenbaum, mit rund-
lichten dunkelgrünen, unten weiß wollich-
ten Blättern, und größern ganz reifen
Früchten, wächst auf Bergen und alten
Ruinen.
- 150 Schwarzer Maulbeerbaum.
- 151 Weißer Maulbeerbaum, dessen Blätter das
Futter für die Seidenwürmer abgeben.
- 152 Chinesischer Maulbeerbaum, mit großen un-
ten ganz weich wollichten Feigenblättern.
- 153 Der Wachsbäum, immergrünender Wachs-
ferzenbaum.
- 154 Gemeiner Provenzer - Ölbaum, von dessen
Früchten das Baumöl gemacht wird.
- 155 Staudiger Hauhechel mit rothen Blumen.

Nro Δ

	Q.	fl.	fr.
Padus. siehe Prunus.			
Paliurus. siehe Rhamnus.			
Passiflora. siehe unter Glashaus - Gewächsen.			
Periclymenum. siehe Lonicera.			
156 ♀ PERIPLOCA <i>græca</i> . Sp. 1. fol. 309. Apocynum folio oblongo.	-	-	15
Persica. siehe Amygdalus.			
157 ♂ PHILADELPHUS <i>coronaria</i> . Sp. 1. fol. 671. Syringa alba sive philadelphus.	-	-	10
Phlomis. siehe unter Glashaus - Gewächsen.			
PINUS mit zwey Nadeln.			
158 ♀ PINUS <i>sylvestris</i> . Sp. 1. fol. 1418. Pinus sylvestris.	-	-	36
159 ♀ PINUS <i>rubra</i> . Haus vatt. Pinus sylvestris, foliis brevioribus, glaucis, conis parvis.	-	-	45
160 ♀ PINUS <i>Virginiana</i> . Haus vatt. Pinus Virginiana foliis binis brevioribus.	-	-	50
161 ♀ PINUS <i>pinæa</i> . Sp. 2. Pinus sativa.	-	I	30
Mit drey Nadeln.			
162 ♀ PINUS <i>æda</i> . Sp. 3.	-	-	48
Mit fünf Nadeln.			
163 ♀ PINUS <i>cembro</i> Sp. 4. Pinus sylvestris cembro dicta.	-	-	48

156 Indianische Rebe, virginische Seide mit kleinen braunrothen Blumen.

157 Wilder Jasmin, Bastardjasmin, falscher Syringenstrauch.

158 Die gemeine Fichte, Kiefer, Kienbaum, Fohre, Forle, Kienforche, Schleifholz, Spänholz

159 Die schottische Fuhre mit kurzen dicken gestreiften Nadeln.

160 Die zwonadliche stadlichte Fuhre.

161 Zahme Pinuß, Pignollenbaum, Piniolen.

162 Drenblättrige frankincense Fuhre, der Weyrauchbaum.

163 Zirbelnuß, Zerbelfichte, Ziernuß, Urben.

Nro Δ

Abies, Tannen, an welchen die Nadeln
einzeln wachsen.

164 h PINUS *abies alba*. Sp. 11.

Abies foliis solitariis apice acuminatis.

165 h PINUS *abies balsamea* Sp. 9.

*Abies conis sursum spectantibus, sive
mas.*

166 h PINUS *abies picea*. Sp. 8.

*Abies taxifolio, fructu longissimo pen-
dente.*

167 h PINUS *abies mariana*. Haus vatt.

LARIX.

168 h PINUS *Larix decidua*. Sp. 7.

Larix folio deciduo, conifera.

169 h PINUS *Larix Cedrus*. Sp. 6.

Cedrus conifera, foliis laricis.

170 h PLATANUS *orientalis*. Sp. 1. fol. 1417.

Platanus orientalis verus.

171 h PLATANUS *occidentalis*. Sp. 2.

Platanus occidentalis aut virginienfis.

172 h POPULUS *nigra*. Sp. 3. fol. 1463.

Populus nigra.

173 h POPULUS *nigra Italica*.

174 h POPULUS *alba*. Sp. 1.

Populus alba majoribus foliis.

175 h POPULUS *alba* foliis minoribus varie-
gatis.

176 h POPULUS *tremula*. Sp. 2.

Populus tremula.

177 h POPULUS *heterophylla*. Sp. 5.

*Populus magna Virginiana, foliis am-
plissimis, ramis nervosis, quasi qua-
driangulis.*

Q. A. fr.

- - 36

- I 20

- - 28

- - 45

- - 30

- - -

- - 20

- - 25

- - 15

- - 15

- - 8

- - 10

- - 8

- - 15



Nro

164 Weißtanne, Edeltanne, insgemein die Tanne.

165 Die Balsamtanne, oder die Gileadische Tanne.

166 Die Fichte, Rothtanne, Harz- oder Pechtanne, insgemein der Fichtenbaum.

167 Die amerikanische schwarze Pechtanne.

Lerchenbaum.

168 Lerchenbaum, Lierbaum, Leertanne, Rothbaum, Schönholz.

169 Ceder von Libanon.

170 Achter orientalischer Platanus.

171 Gemeiner oder amerikanischer Platanus.

172 Schwarze Pappeln, Pappelweide, Garbaschen, Salbenbaum, schwarzer Alberbaum.

173 Italiänischer Pappelbaum.

174 Weiße Pappeln, weißer Alberbaum, Abelen, Albe, Zabelke, heiligen Bösenholz.

175 Eine Abartung mit kleinen makulirten Blättern.

176 Espen, Aspen, Zitterpappeln, Flatteraspe, Rittersche.

177 Die Carolinische Pappel oder Esche mit größeren Blättern, deren junge Schüsse fünf scharfe Kanten haben.



Nro Δ

178	♂	POPULUS <i>balsamifera</i> . Sp. 4. Populus foliis ovatis acute serratis.	-	-	18
179	♀	POTENTILLA <i>fructicosa</i> . Sp. 1. fol. 709. Pentaphiloides rectum fructicosum.	-	-	15
180	♂	PRINOS <i>verticillatus</i> . Sp. 1. fol. 471. Aquifolium foliis deciduis.	-	-	30

PRUNUS.

181	♂	PRUNUS <i>domestica</i> . fol. 677. Haus vatt.	-	-	24
-----	---	--	---	---	----

b.		Prunus flore semiduplici.	-	-	24
----	--	---------------------------	---	---	----

c.		Prunus nucleo nudo, segmento circuli osseo comitato.	-	-	24
----	--	--	---	---	----

d.		Prunus flore pleno, fructu albo, amplissimo.	-	-	24
----	--	--	---	---	----

e.		Prunus fructu rotundo, cerasi formi rubro.	-	-	20
----	--	--	---	---	----

182	♂	PRUNUS <i>spinosa</i> . Haus vatt.	-	-	8
-----	---	------------------------------------	---	---	---

183	♀	PRUNUS <i>insititia</i> . Haus vatt.	-	-	15
-----	---	--------------------------------------	---	---	----

184	♀	PRUNUS <i>pumila</i> . Haus vatt.	-	-	20
-----	---	-----------------------------------	---	---	----

ARMENIACA.

185	♂	PRUNUS <i>armeniaca</i> . Sp. 7.	-	-	30
-----	---	----------------------------------	---	---	----

b.	♂	Prunus americana foliis variegatis.	-	-	35
----	---	-------------------------------------	---	---	----

186	♂	PRUNUS <i>armeniaca sibirica</i> . Sp. 8.	-	-	30
-----	---	---	---	---	----

CERASUS.

187	♂	PRUNUS <i>Cerasus avium</i> . Sp. 10.	-	-	24
-----	---	---------------------------------------	---	---	----

b.	♂	Prunus Cerasus major ac sylvestris multiplici flore.	-	-	24
----	---	--	---	---	----

Nro

178 Balsampappel.

179 Staudiges fünf Fingerkraut, mit gelben Blumen.

180 Winterbeerstaude, der eigentliche Pflaumenbaum.

Pflaumen.

181 Gemeiner Pflaumenbaum. sieh Pomona Th. I.

b. Pflaume mit halb gefüllter Blüthe.

c. Pflaume ohne Stein.

d. Pflaume mit ganz gefüllter Blüthe und einer weißen großen schmackhaften Frucht.

e. Mirabulon oder Kirschpflaume.

182 Schlehen, Schleedorn, Schwarzdorn.

183 Krichen oder zahme Schlehen.

184 Canadische Zwergkirsche, ist ganz niedrig, hat schmale oben grüne, unten blaulichte Blätter.

Abricosen.

185 Der Abricosenbaum. sieh Pomona Tom. I.

b. Abricosenbaum mit geschecktem Laub.

186 Die siberische oder schwarze Abricosen.

Kirschenbaum.

187 Waldkirschen, Holzkirschen, Zwieselbeeren, Kaffbeeren. sieh Pomona Tom. II.

b. Waldkirsche mit gefüllter Blüthe.

Nro Δ

	Q	fl.	fr.
188 h PRUNUS <i>Cerasus vulgaris</i> . Sp. 9. Cerasus fativa fructu rotundo rubro & acido.	-	-	25
b. h Cerasus hortensis flore pleno.	-	-	30
c. h Cerasus hortensis racemosa.	-	-	24
d. h Cerasus racemosa uno pediculo plura.	-	-	25
189 h PRUNUS <i>Cerasus austera</i> . Haus vatt. Cerasus acidissima succo sanguineo.	-	-	20
190 ♂ PRUNUS <i>Cerasus prunila</i> . Haus vatt.	-	-	24
191 h PRUNUS <i>Cerasus Mahaleb</i> . Sp. 6. Cerasus sylvestris amara, Mahaleb pu- tata.	-	-	24
PADUS.			
192 ♂ PRUNUS <i>padus avium</i> . Sp. 1. Padus foliis annuis.	-	-	15
193 4 PRUNUS <i>padus rubra</i> . Haus vatt. Prunus padus lauro Cerasus. siehe unter Glashaus - Gemächsen.	-	-	15
194 ♂ PTELEA <i>trifoliata</i> . Sp. 1. fol. 173. Frutex virginiacus trifolius.	-	-	20
195 ♂ PTELEA <i>pentaphylla</i> . Haus vatt.	-	-	-
PYRUS.			
196 h PYRUS <i>communis</i> . Sp. 1. fol. 686.	-	-	15
b. Pyrus fativa flore pleno.	-	-	15
c. Pyrus carne rubente.	-	-	15
d. Pyrus fructu medio pyramidato ob- tuso glabro viridi seratino.	-	-	15
197 h PYRUS <i>irregularis</i> . Haus vatt.	-	-	15
Ma-			

188 Die gemeine Gartenkirsche: von dieser giebt es gar viele Abartungen, welche in der Pomona nachzufuchen Tom. II.

b. Gartenkirsche mit extra schönen großen gefüllten weißen Blumen.

c. Die immer blühende Kirsche, Aller Heiligen Kirsche.

d. Die Traubelkirsche, Bouquetkirsche.

189 Schwarze Sauerkirsche, Weichseln, Amarellen.

190 Zwergkirsche, Zwergweichseln.

191 Steinweichseln, Mahaleb, Magaleb, Dinstenbeere.

Vogelkirsche.

192 Vogelkirschen, Ahlkirschen, Traubenkirschen, Holzkirschen.

193 Der große Vogelbeerbaum.

194 Carolinischer Staudenklee.

195 Staudenklee mit fünf Blättern.

Birnbaum.

196 Der gemeine Birnbaum. sieh Pomona III. Th.

b. Birnbaum mit gefüllter Blüthe.

c. Die Blutbirne.

d. Birn mit krausen Koblblättern.

197 Die Lazarolenbirn.

Nro Δ

MALUS.

198 ♀ PYRUS *Malus sylvestris*. Haus vatt.

♀ b. *Malus pumila*.

♂ c. *Malus apetala*.

♂ d. *Malus pleniflora*.

CYDONIA.

199 4 PYRUS *Cydonia maliforma*. Haus vatt.

200 4 PYRUS *Cydonia oblonga*. Müll.

201 ♂ RHAMNUS *catharicus*. Sp 1. fol. 279.
Rhamnus catharicus.

202 ♀ RHAMNUS *alpinus*. Sp. 4.

Frangula rugosiore & ampliore folio.

203 ♂ RHAMNUS *frangula alnus*. Sp. 5.

Alnus nigra baccifera.

204 ♂ RHAMNUS *paliurus*. Sp. 12.

Rhamnus folio subrotundo, fructu
compresso.

205 4 RHUS *coriaria*. Sp. 1. fol. 379.

Rhus folio ulmi.

206 ♀ RHUS *glabrum*. Sp. 4.

Rhus Virginianum.

207 4 RHUS *Typhium*. Sp 2.

Rhus Virginianum.

208 Rhus

Der Apfelbaum.

198 Der Apfelbaum.

b. Der Paradis oder Johannisapfel, Zwergapfel

c. Apfel ohne Blüthe, Feigenapfel.

d. Apfel mit gefüllter Blüthe.

Quittenbaum.

199 Apfelquitten.

200 Birnquitten.

201 Kreuzdorn, Kreuzbeer, Begeedorn, Stechdorn, Dintenbeerstaude, Rheinbeere, Hundsbäumholz, Hirschdorn, Sinngrün, Blasen grün.

202 Der Alpen-Kreuzdorn.

203 Faulbeeren, Faulbaum, Pinnholz, Rapfenholz, Ahlkirsche, Elsebaum, schwarze Erle, schwarze Schißbeere, wilde Kirschen, Hundsbäum, Grundholz, Pulverholz.

204 Christdorn, dessen Saamen Juden-Sabbathdeckel gleichet.

205 Hirschkolbenbaum, Sumach, Essigbaum, Hirschhorn, Gerberbaum, ist hier zu Lande zu Haus.

206 Der glatte Sumachbaum aus Neuengland, ist der höchste, ganz glatt, trägt keinen Saamen.

207 Amerikanischer oder Carolinischer Sumach mit röthlicher gestreifter Rinde, und den größten rothen Kolben.

208 Klei

Nro Δ

	Q	fl.	fr.
208 4 <i>Rhus copalinum</i> . Sp. 6. Rhus Virginianum lentisci foliis.	-	-	35
209 ♂ <i>Rhus cotinus</i> . Sp. 15. Cotinus Coriaria.	-	-	30
210 4 <i>Rhus Toxicodendrum</i> . Sp. 9. Arbor trifolia veneta Virginiana folio hirsuto.	-	-	8
211 ♀ <i>Rhus Toxicodendron radicans</i> . Sp. 8. Toxicodendron amplexi caule, foliis minoribus glabris.	-	-	8
212 4 <i>Rhus Toxicodendron vernix</i> . Sp. 5. Arbor venenata.	-	-	8
RIBES.			
213 ♂ <i>RIBES rubrum</i> . Sp. 1. fol. 290. Ribes vulgare acidum.	-	-	6
b. Ribes fructu albo lucido.	-	-	10
c. Ribes fructu incarnato.	-	-	10
214 ♀ <i>RIBES alpinum</i> . Sp. 2. Ribes alpinum dulce.	-	-	10
215 ♂ <i>RIBES nigrum</i> . Sp. 3. Ribes vulgare fructu nigro.	-	-	8
GROSSULARIA ACULEOSA.			
216 ♂ <i>RIBES grossularia</i> , uva crispa. Sp. 7. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris.	-	-	8
217 ♂ <i>RIBES grossularia hirsuta</i> . Haus vatt. b. Grossulario fructu rotundo maximo virescente.	-	-	10
218 ♂ <i>RIBES grossularia oxycanthoides</i> . Sp. 6.	-	-	8
219 h <i>ROBINIA pseudo acacia</i> . Sp. 1. fol. 1043. Pseudo acacia.	-	-	12

- 208 Kleiner Sumach mit geflügelten Stielen, und kleinen Blättern.
- 209 Der Parukenbaum, Färberbaum mit einzelnen glatten grasgrünen ovalen Blättern.
- 210 Wolligter Giftbaum.
- 211 Der kletternde glatte Giftbaum.
- 212 Die Giftestche.
- Johannisbeere ohne Stacheln.
- 213 Gemeine rothe Johannisbeere, Johannis-
trauben, Rübischelstaude.
- b. Johannisstrauch mit weißen Beeren.
- c. Fleischfärbige Johannisbeere.
- 214 Straußbeere, wilde Johannisbeere, Rech-
beere.
- 215 Schwarze Johannisbeere, Gichtbeere, Bock-
beere, schwarze Zeitbeere.
Stachelbeere.
- 216 Wilde Stachelbeere, große Albeere.
- 217 Garten-Stachelbeere, Klosterbeere.
- b. Stachelbeere mit den größten runden grü-
nen Früchten.
- 218 Röthlichte Canadische Stachelbeere mit pur-
purfärbigem Saft.
- 219 Der weiße Acacienbaum, amerikanischer
Schottendorn.
- 220 Roth-

Nro Δ

220 4 ROBINIA *bispida*. Haus vatt.

221 4 ROBINIA *caragana*. Sp. 4.
Asphalatus arborefcens.

ROSA.

222 ♂ ROSA *villosa*. Sp. 6. fol. 703.
Rosa fylveftris pomifera major.

223 ♂ ROSA *inermis*. Haus vatt.
Rosa campeftris fpinis carens biflora

224 ♂ ROSA *lutea fimplex*. Haus vatt.

225 ♂ ROSA *punicea*. Haus vatt.
Rosa flore intus phæniceo, extus luteo
fimplex.

226 ♂ ROSA *Indica* fructu rotundo nigro.

Halb gefüllte Roſen.

227 ♂ ROSA *alba major*. Sp. 13.
Rosa alba vulgaris major femiplena.

228 ♂ ROSA *gallica*. Sp. 8.
Rosa rubra flore femipleno.

b. ♀ Rosa gallica flore violaceo.

229 ♂ ROSA *præneſtina* verſicolor. B.

230 ♂ ROSA *Damaſcena* flore rubello fructu
ſpinoſo. Haus vatt.

Ganz gefüllte Roſen.

231 ♀ ROSA *nana pimpinelli folia*. Müll.

Nro

220 Rothblühender Schottendorn, rosenfärbige
Acacia.

221 Siberischer Erbsenbaum.

Rosen. erstens die einfachen.

222 Die große Hanbitten - Rose mit lichtrothen
Blumen, und großen runden stachelichten
Früchten.

223 Rothblühende Rose ganz glatt ohne Stas
cheln aus der Schweiz.

224 Die gelbe einfache Rose, die gelbe Glanz
rose ohne Geruch.

225 Die türkische einfache Sammetrose, inwen
dig mit rothen Carminsammet, außen gel
ber Farbe.

226 Einfache rothe Pimpernelrose mit schwar
zen runden glänzenden Hiefen.

227 Halb gefüllte weiße Bisamrose, Muskröse.

228 Niedrige rothe Zuckerrose, Zuckerpazen.

l. Violete niedrige Zuckerrose, ist eine Abar
tung der vorigen.

229 Bunte Rose mit roth und weiß gestreiften
Blättern.

230 Lichtrothe Damascener Rose mit starkem
Geruch, großen länglichten stachelichten
Früchten.

231 Die kleine Pimpernelrose, Ranunkelrose,
mit dunkel purpurrothen Blumen.

Nro Δ

	Q	L	fr.
l. ♀ Rosa pimpinelli folia flore roseo.	-	-	20
232 ♂ Rosa sempervirens. Sp. 9. Rosa moschata sempervirens flore al- bo.	-	1	-
233 ♂ Rosa alba minor flore pleno, odore moschato Duhamel multiflora dicta.	-	-	12
234 ♂ Rosa basilica ex albido colore & ru- bellò varia. Duham.	-	-	12
235 ♂ Rosa provincialis major. Duham. Rosa plenissima vulgo changendi dicta.	-	-	10
236 ♂ Rosa heloserica multiplex. Hausvatt. Rosa batavica flore violaceo plenissi- mo.	-	-	12
237 ♂ Rosa damascena flore rubro, foliis subtus albis. Müll.	-	-	10
238 ♂ Rosa omnium Calendarum, flore ple- no roseo varietas.	-	-	10
239 ♂ Rosa majalis rubeilo flore. Duham. Rosa flore minori incarnato pleno spi- nis copiosissimis albis, quæ vulgo majalis dicitur.	-	-	3

240 Rosa

b. Die ganz lichtrothe Zwerg - Manunkelrose.

- 232 Die immer grüne weiße Bisamrose / Bouquetrose: ist eine von den seltensten, und nicht viel bekannt: ist zart, hält die Kälte im Winter ohne Bedeckung nicht wohl aus.
- 233 Die ganz weiße gefüllte niedrige Rose mit starkem Bisamgeruch.
- 234 Gefüllte Rosenstaude mit rosenroth und weiß schillernten Blumen, eine ganz neue rare Sorte, ist sehr hart zu vermehren.
- 235 Dunkelrothe stark gefüllte Provinzrosen, Knopfsrosen, insgemein die schillernte in das hochcarmesin und violete spielende Schillerrose genannt.
- 236 Ganz violete stark gefüllte Purpur - Sammetrose, ist sehr prächtig, und selten, eine Abartung der vorigen.
- 237 Große gefüllte Damascener Rose mit starkem Geruch, die Blumenblätter sind unten blaßroth, oben hochroth, hat sehr weiche kurze Stacheln.
- 238 Die große gefüllte rothe wohlriechende Mosnatrose, soll eine Abartung der vorigen seyn.
- 239 Kleine rothe Mayrose mit häufigen weißen Stacheln, ist die erstere. Haus vatt. macht eine Abartung von der Provinzrose, welche gar nichts ähnliches mit dieser hat.

Nro Δ		Q	l.	ff.
240	♂ Rosa <i>persica</i> major floribus rubello violaceis majoribus purpureis conspersis. Reg. Flor. Tom. I.	-	-	8
241	♂ Rosa <i>narbonensis</i> ex rubro nigricanti flore plenissimo non spinoso, foliis crassis, vulgo Rosa Narbonensis flore rubro foliis crassis. Eyst. Hort.	-	-	10
242	♂ Rosa <i>lutea</i> multiplex. Haus vatt. vulgo Rosa centifolia flore luteo plenissimo inodorata.	-	-	15
243	♂ Rosa <i>centifolia batavica</i> . Sp. 7. Rosa rubra plena spinosissima pedunculo muscoso. Müll.	-	-	10
244	♀ Rosa <i>muscosa</i> . Müll. Rosa foliis utrimque vilosis, flore pleno centifolia similis.	-	-	24
	b. Rosa <i>muscosa monstrosa</i> foliis utrimque muscosis.	-	-	30
	Rosmarinus. siehe unter Glashaus - Gewächsen.			
245	♀ RUBUS <i>odoratus</i> . Sp. 9. fol. 706. Rubus odoratus.	-	-	8
246	♀ RUBUS <i>occidentalis</i> . Sp. 2. Rubus idæus fructu nigro virginianus.	-	-	8
247	♀ RUBUS <i>idæus</i> fructu rubro. Haus vatt.	-	-	6
	b. ♀ Rubus <i>idæus</i> fructu albo.	-	-	6
248	♀ RUBUS <i>jamaicensis</i> . flore albo pleno.	-	-	36
249	♀ RUSCUS <i>aculeatus</i> . Sp. 1. fol. 1474. Ruscus myrtifolius aculeatus.	-	-	8

Ro.

- 240 Große Persianische Rose mit violetrothen großen Blumen, und purpurrothen Flecken.
- 241 Dunkelrothe Marbonische Rose mit steifen Stielen und Blättern, und weichen Stacheln.
- 242 Ganz gelbe Centifolienrose ohne Geruch, muß vor Regen und Nässe verwahret werden, ansonst bersten die Blumen.
- 243 Die rothe Centifolienrose, ist eine der bekanntesten und schönsten Rosen, mit häufigen gebogenen Stacheln.
- 244 Die ganz moosigte rauhe rothe Centifolienrose, deren Blätterknöpfe ganz braunhaaricht und moosigt sind, ist hart zu vermehren.
- b. Eine Abartung von der moosigten Rose.
- 245 Wohlriechende Canarische Brombeere, mit schönen rothen dem Cistusröslein gleichenden Blumen, ist der schönste.
- 246 Virginische Himbeere mit schwarzer Frucht.
- 247 Gemeine Himbeere mit rother Frucht, Himmelbeere, Himbreimen.
- b. Weiße Himbeere.
- 248 Brombeere mit weißen gefüllten Blumen.
- 249 Stechender Palm, Mäusedorn, Rüsken, Myrtendorn, hat ganz stachelichte Blätter, ist der niedrigste.

Nro Δ

	Gr.	fl.	fr.
250 ♀ <i>Ruscus hypophyllum</i> . Sp. 1. <i>Ruscus alexandrina</i> , <i>chamae daphne</i> .	-	-	10
<i>b. Ruscus latifolius</i> fructu ex medio foliorum extrapendente.	-	-	10
Die übrigen suche unter Glashaus - Gewächsen.			
251 ♀ <i>RUTA hortensis</i> . Sp. 1. fol. 548. <i>b. Ruta foliis variegatis</i> .	-	-	4
252 ♂ <i>SALIX alba</i> . Sp. 1. fol. 1442. <i>Salix vulgaris alba arborefcens</i> .	-	-	3
253 24 <i>SALIX purpurea</i> . Sp. 10. <i>Salix rubra minima fragilis folio longo angusto</i> .	-	-	4
254 24 <i>SALIX vitellina</i> . Sp. 5. <i>Salix fativa lutea</i> , folio crenato.	-	-	6
255 ♂ <i>SALIX amygdalina</i> . Sp. 6. <i>Salix folio amygdalino utrimque virente aurito</i> .	-	-	5
256 ♂ <i>SALIX aurita</i> . Sp. 20. <i>Salix folio rotundo minore</i> .	-	-	-
257 ♀ <i>SALIX fusca</i> , vulgo <i>Salix buxifolia</i> . Sp. 26. <i>Salix pumila folio utrimque glabro</i> .	-	-	8
258 ♀ <i>SALIX cinerea</i> . Sp. 30. <i>Salix foliis integris glabris lanceolato ovatis</i> .	-	-	6
259 24 <i>SALIX babylonica</i> . Sp. 9. <i>Salix orientalis</i> , flagellis deorsum pulchre pendentibus.	-	-	8
260 ♀ <i>SALVIA officinalis</i> . Sp. 4. fol. 33.	-	-	3

b. Sal-

- 250 Rapsenblatt, Affenblatt, mit glatten Blättern, dessen rothe runde Früchte an den Blättern wachsen.
b. Rapsenblatt, dessen rothe runde Früchte aus der Mitte der Blätter herauswachsen.
- 251 Die gemeine Gartenraute.
b. Gartenraute mit makulirten Blättern.
- 252 Gemeine weiße Weide, zähe Weide, bittere Weide, Gelbe.
- 253 Rothe gemeine Weide, rothe Bindweide, zähe Weide.
- 254 Die gelbe Weide, Goldweide, Dotterweide, ist die beste Bindweide.
- 255 Weide mit Mandelblättern.
- 256 Salbenblättrige Kampfwende, Sandwerfwende, Kugelweide.
- 257 Burbaum-blättrige Weide.
- 258 Die graublättrige Waldweide, mit brauntlichten Blumenfäßchen.
- 259 Die Babylonische Weide, die Hangelweide, die weinende Weide.
- 260 Die gemeine Salben.

Nro Δ

	Q	l.	fr.
b. <i>Salvia major</i> , foliis ex albo & viridi variegatis.	-	-	12
c. <i>Salvia major</i> , foliis ex luteo & viridi variegatis.	-	-	8
d. <i>Salvia perelegans tricolor argentea belgarum</i> . Hausvatt.	-	-	15
Die übrigen suche unter Glashaus-Gewächsen.			
261 h <i>SAMBUCUS nigra</i> . Sp. 3. fol. 385. Sambucus fructu in umbella nigro.	-	-	5
b. ♂ <i>Sambucus humilior frutescens</i> , foliis eleganter variegatis.	-	-	10
262 4 <i>SAMBUCUS</i> fructu in umbella viridi. Hausvatt.	-	-	8
263 4 <i>SAMBUCUS laciniata</i> . Hausvatt.	-	-	8
264 ♀ <i>SAMBUCUS racemosa</i> . Sp. 4. Sambucus racemosa, acinis rubris.	-	-	6
Siliquastrum. siehe Cercis.			
265 ♀ <i>SOLANUM dulcamara</i> Sp. 5. fol. 263. Solanum scandens seu dulcamara.	-	-	8
b. <i>Solanum scandens</i> , seu <i>dulcamara</i> foliis ex aureo variegatis.	-	-	10
266 h <i>SORBUS aucuparia</i> . Sp. 1. fol. 683. Sorbis sylvestris, foliis domesticæ similis.	-	-	8
267 h <i>SORBUS domestica</i> . Sp. 3. Sorbis sativa.	-	-	10
268 b. h <i>Sorbis sativa</i> fructu seratino minoriturbinato rubente. Turn.	-	-	10
269 ♂ <i>SPARTIUM genista hispanica</i> . Sp. 13. fol. 995. Genista tinctoria hispanica.	-	-	3

- b. Die versilberte Salben, ist die schönste und zärteste.
 - c. Die vergoldete Salben.
 - d. Salben mit dreyfärbigen Blättern, violet, roth, und weiß, ist die rareste und zärteste.
-
- 261 Gemeiner Hollunder, Flieder, Flitter, Hol-
der, Baumholder, Holler.
b. Niedriger Hollunder mit schönen weiß und
grün gefleckten Blättern.
 - 262 Hollunder mit weißen Beeren.
 - 263 Hollunder mit Petersilienblatt.
 - 264 Rother Berghollunder, Traubenholder,
wächst hin und her in Wäldern, Hirschhol-
lunder.
 - 265 Allfranken, Bittersuß, je länger je lieber,
wilde Stuckwurz, Mäuseholz.
b. Bittersuß mit gelb maulirten Blättern.
 - 266 Vogelbeere, Quitschenbaum, Aberesche, Esch-
rößl, Ebrichbaum, Pihilbeer, Limbaum.
 - 267 Spierling, Sperbirn, Sperberbaum, Spen-
erling, Drecksäck, Sorbbirne, Agatbaum.
 - 268 Sorbapfel, Sperapfel, Spierling mit einer
runden Frucht.
 - 269 Portugiesische Genister.

Nro Δ

	Q	fl.	fr.
270 ♂* SPARTIUM <i>juncum</i> . Sp. 2. Genista juncea.	-	-	8
271 ♂ SPIRÆA <i>salicifolia</i> . Sp. 1. fol. 700. vulgo Spiræa Theophrasti.	-	-	8
272 ♀ SPIRÆA <i>alba</i> . Müll.	-	-	8
273 ♂ SPIRÆA <i>tomentosa</i> . Sp. 2. Ulmariapentacarpos, integris ferratis foliis parvis subtus incanis, Virginiana.	-	-	10
274 ♂ SPIRÆA <i>hypericifolia</i> . Sp. 3. Pruno sylvestris affinis canadensis.	-	-	8
275 ♂ SPIRÆA <i>opulifolia</i> . Sp. 6. Evonymus Virginiana, ribeii folio.	-	-	8
276 ♂ SPIRÆA <i>crenata</i> . Sp. 5. Spiræa hispanica hyperici folio crena- to.	-	-	-
277 4 STAPHYLÆA <i>pinata</i> . Sp. 1. fol. 386. Staphylodendron sylvestre & vulgare vulgo Pistacia.	-	-	12
278 ♂ STAPHYLÆA <i>trifoliata</i> . Sp. 2. Staphylodendron Virginianum trifo- liatum.	-	-	12
Symphori carpos. fude Lonicera.			
279 4 SYRINGA <i>vulgaris</i> . Sp. 1. fol. 11. Syringa vulgo lilac flore cœruleo.	-	-	6
280 4 SYRINGA <i>vulgaris</i> flore albo. Müll.	-	-	6
281 4 SYRINGA flore saturate purpureo. Müll.	-	-	10
282 ♂ SYRINGA <i>persica</i> . Sp. 2. foliis lanceolatis flore violaceo cœ- ruleo.	-	-	10

b. ♂ Sy-



Nro 270

270 Spanischer Genister.

271 Gemeine Spierstaude mit rothen Blumen.

272 Weiß blühende amerikanische Spierstaude mit dem kleinsten Laube.

273 Spierstaude mit rauhen Blättern aus Philadelphia.

274 Spierstaude mit Johanniskraut-Blatt aus Canada.

275 Spierstaude mit Wasserholder-Blättern.

276 Spanische Spierstaude.

277 Klappernuß, Pimpernußlein, wilde Pistazien, Todtenkapp-Baum, Paternosterbaum.

278 Amerikanische drehblättrige Klappernuß, hat kleinere Früchte, und bleibt etwas niedriger.

279 Blauer spanischer Hollunder, Türkischer Hollunder, Kandelblüh, Syringen.

280 Spanischer Hollunder mit weißen Blumen, Nägeleinsbaum.

281 Spanischer Hollunder mit roth violeten schönen Blumen, ist der schönste, blüht sehr lang.

282 Niedriger Persischer Syringentrauch mit gespitzten Blättern, und einer violetblauen Blume.

Nro Δ

	Q	R	fr.
b. ♂ Syringa persica foliis lanceolatis flore rubro violaceo.	-	-	10
c. ♂ Syringa foliis lanceolatis flore albo umbone caeruleo.	-	-	12
283 ♂ SYRINGA foliis laciniatis dissectisque, floribus parvis dispersis. Müll. Ligustrum foliis laciniatis.	-	-	8
Tacamahaca. siehe Populus.			
284 ♂ TAMARIX germanica. Sp. 2. fol. 385. Tamarix fruticosa, folio crassiore, si- ve germanica.	-	-	10
285 ♂ TAMARIX gallica. Sp. 1. Tamarix Narbonensis.	-	-	12
286 4 TAXUS baccata Sp. 1. fol. 1472. Taxus Europæus.	-	-	10
Teucrium. siehe unter Glashaus-Gewächsen.			
287 h THUJA occidentalis Sp. 1. fol. 1421. Arbor vitæ.	-	-	15
288 4 THUJA orientalis. Sp. 2. Thuja strobilis ucinatis, squamis re- flexo acuminatis.	-	-	15
Thymus. siehe unter perennirenden Gewächsen.			
289 h TILIA europæa. Sp. 1. fol. 733. Tilia foliis moliter hirsutis, viminibus rubris fructu tedragono.	-	-	15

b. Niedrige Syringen mit roth violeten Blumen, ist prächtig.

c. Niedriger Syringentrauch mit perlenweißen Blumen, inwendig blauen Puzen.

Sind Abartungen, und prächtig zierende Streicher.

283 Syringentrauch mit zertheilten, zerfetzten Blättern, und kleinern blauen Blumen, welche an ihren Stängeln weitläufig stehen.

284 Margwispe, deutscher Tamariskenstrauch.

285 Französischer Tamariskenstrauch.

286 Larusbaum, Eiben, Eben, Efen, Eisenbaum.

287 Der gemeine Lebensbaum, amerikanischer Cederbaum, wird sehr hoch, und hat die kleinsten schuppichten Zapfen.

288 Chinesischer Lebensbaum, hat ganz flache grüne Zweige mit kugelrunden Zapfen, mit dicken zugespizten Schuppen, und runden Saamenkernen.

289 Gemeine großblättrige Linde, Wasserlinde, Graslinde.

Nro Δ

	Gr.	fl.	fr.
290 ♀ <i>TILIA cordata</i> . Haus vatt. Tilia foemina folio majore.	-	-	-
291 ♀ <i>TILIA americana</i> . Sp. 2. Tilia americana nigra.	-	-	45
• Tinus ſuche Viburnum unter Glashaus- Gewächſen.			
• Toxicodendron. ſuche Rhus.			
• Tulipifera. ſuche Liriodendron.			
292 24 <i>VIBURNUM lantana</i> . Sp. 5. fol. 383. Viburnum vulgo.	-	-	8
293 24 <i>VIBURNUM opulus</i> . Sp. 7. Sambucus aquatica, flore ſimplici.	-	-	8
294 24 <i>VIBURNUM roſeum</i> flore globoso. Müll. vulgo Sambucus aquatica, flore pleno albo.	-	-	01
b. Viburnum roſeum foliis variegatis.	-	-	12
295 ♂ <i>VIBURNUM dentatum</i> . Sp. 4.	-	-	10
296 ♂ <i>VIBURNUM pruniſolium</i> . Sp. 3. Viburnum Canadenſe glabrum.	-	-	10
297 ♀ <i>VINCA minor</i> . Sp. 1. fol. 304. Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore cœruleo.	-	-	5
b. Vinca foliis ex lutco eleganter varic- gatis, flore albo.	-	-	5

290 Die Steinlinde, Waldblinde, Sandlinde mit kleinen Blättern.

291 Amerikanischer schwarzer Lindenbaum.

292 Schlingenbaum, Wegschlinge, weißer Schlingbaum, Haubeere, Raubeere, Mehlbaum, ist hin und her in Hecken zu finden, hat schöne weiße Blumen in großen Dolden.

293 Wasserflieger, Bachholder, weiße Ballrose, mit schönen scharlachrothen Beeren.

294 Schneeballenbaum, Rosenholder, Holler Rosenbaum, Baumrose, Gelderrose.

b. Schneeballenbaum mit schön gesecktem Laube.

295 Amerikanischer Schlingenbaum mit zugespitzten länglichten tief ausgezahnten Blättern, und schwarzen langen runden Früchten.

296 Virginischer Schlingenbaum mit Pfauenblättern, und runden schwarzen breit gedruckten Früchten.

297 Sinngrün, Ingrün, Wintergrün, kriechet auf der Erde, unter den Stauden blühen einige blau, andere weiß.

b. Sinngrün mit gelb und grün makulirten Blättern und weißen Blumen.

c. Sinn

Nro Δ

	Q	l.	ff.
c. Vinca foliis ex albo eleganter varie-	-	-	5
gatis, flore albo.			
d. Vinca flore purpureo pleno.	-	-	10
298 ♀ VINCA major. Sp. 2.	-	-	6
Pervinca vulgaris major, latifolia flore			
coerulco.			
b. Vinca latifolia flore albo.	-	-	-
Vitex. siehe unter Glashaus-Gewächsen.			2
299 ♀ VITIS vinifera. Sp. 1. fol. 293.	-	-	8
b. ♀ Vitis aepyrena, acino minimo rotun-	-	-	12
do albido, sine nucleis, Corinthia			
dicta.			
c. ♀ Vitis acinis variegatis. Haus vatt.	-	-	12
300 ♀ Vitis laciniosa. Sp. 6.	-	-	10
Vitis laciniatis foliis.			
301 ♀ Vitis labrusca. Sp. 3.	-	-	8
Vitis hederæ folio ferrato.			
302 h ULMUS campestris. Sp. 1. fol. 327.	-	-	6
Ulmus campestris & Theophrasti.			
303 h ULMUS glabra. Müll.	-	-	12
Foliis ovatis glabris, acute ferratis.			
Uva ursi Duham. sieh Arbutus.			
Xylostemum. siehe Lonicera.			

Nro

c. Sinngrün mit weiß geschäkten Blättern,
weißen Blumen.

d. Sinngrün mit purpurblauen gefüllten Blumen.

298 Groß aufrecht wachsendes Sinngrün mit
großen blauen Blumen.

l. Groß breitblättriges Sinngrün mit weißen
Blumen.

299 Die Weinrebe, der Weinstock.

l. Corinthentraube ohne Kern.

c. Wein mit weiß und schwarz gestreiften Beeren.

300 Wein mit Petersilienblättern.

301 Wilde virglnische Weinrebe.

302 Die gemeine breitblättrige Ulme, Ulme,
Rüster, Rüster, Fliegenbaum, Ruspelbaum.

303 Glattblättrige weiße Ulme, ist die allerspätste.

Fünf

Fünftes Verzeichniß.

Blumen, Zwiebeln, und Ballengewächse.

Nro	Q.	fl.	kr.
1** AMARYLLIS <i>capensis</i> . Sp. 1. fol. 420. Symplocaria Indicum.	-	-	20
2 AMARYLLIS <i>lutea</i> . Sp. 2. Colchicum primum luteum majus.	-	-	20
3* AMARYLLIS <i>athamascensis</i> Sp. 3. Lilio-Narcissus Indicus pumilus monanthus albus.	-	-	30
4* AMARYLLIS <i>formosissima</i> . Sp. 4. vulgo Iris Suedica. Lilio-Narcissus Jacobæus flore sanguineo nutante.	-	-	8
5** AMARYLLIS <i>belladonna</i> . Sp. 6. Lilium americanum puniceo flore, belladonna dictum.	-	-	40
6* AMARYLLIS <i>longifolia</i> . Sp. 9. Lilium africanum humile longissimis foliis polyanthos saturato colore purpurascens.	-	-	35
7** AMOMUM <i>Zerumbet</i> . Sp. 2. fol. 1. Zingiber latifolium sylvestre.	-	-	40
8 ANEMONE <i>hortensis</i> . Sp. 9. fol. 76r. Anemone hortensis latifolia colore multiplici plenissimo.	-	-	4

Fünftes Verzeichniß.

Blumen, Zwiefeln, und Ballengewächse.

Nro :

- 1 Narcißlilie mit drey Blumen in jeglicher Scheide, blühet im Hornung und März, mit dunkelrothen Blumen, wird im August verſetzt.
- 2 Die gelbe Herſtnarciffen - Lilie, blühet zu Ende Septembers bis November, wird verſetzt im May bis Juny, hält im Freyen aus.
- 3 Die weiße niedrige Indianiſche Amarnllis mit einzelnen weißen Blumen. inſgemein Achaſmaſcolilie, blühet im Frühling.
- 4 Die Lilie von St. Zago, die große rothe breitblättrige Amarnlle, inſgemein Iris ſuedica genannt.
- 5 Die Mexicaniſche Lilie mit hellglänzenden kupferfärbigen rothen Blumen, deren drey bis vier auf einem Stiel ſtehen, und zeitlich im Frühjahr blühen.
- 6 Narcißlilien mit vielen Blumen in einer Scheide, von dunkel purpurrother Farbe, bleibt niedrig, blühet im December.
- 7 Der breitblättrige wilde Ingwer, oder Zerumbet, machet zwey bis drey Schuhe hohe Stängel.
- 8 Morgenländiſche Anemonenblume von manniſgältigen ausnehmenden Farben und Schönheiten.

Nro		Q	fl.	lr.
9	** ANTHOLYZA <i>æthiopica</i> . Sp. 3. fol. 54. Ilyacinthus africanus foliis Colchici floribus coccineis. Gladiolus <i>æthiopicus</i> .	-	-	24
	Arum, vulgo Colocasía. suché Calla <i>æthi-</i> <i>opica</i> .			
10	ARUM <i>Dracunculus</i> . Sp. 1. fol. 2367. vulgo <i>Serpentaria</i> . <i>Dracontium</i> . <i>Dracunculus polyphyllus</i> .	-	-	12
11	** ARUM <i>Colocasía</i> . Sp. 5. Arum maximum <i>ægyptiacum</i> . vulgo <i>Colocasía</i> .	-	-	30
12	** ARUM <i>esculentum</i> . Sp. 6. Arum minus <i>nimphææ</i> folio <i>esculen-</i> <i>tum</i> .	-	-	40
13	ARUM <i>vulgare</i> . Gledt. Arum <i>vulgare</i> non maculatum.	-	-	15
14	* ARUNDO <i>donax</i> . Sp. 2. fol. 120. Arundo <i>fativa</i> .	-	-	15
15	* b. ARUNDO <i>laconica</i> . Arundo <i>Indica laconica</i> <i>versicolor</i> .	-	-	24
16	ASPHODELUS <i>ramosus</i> . Sp. 3. fol. 443. Asphodelus <i>albus ramosus</i> mas. vulgo <i>Baton Royal</i> .	-	-	20
17	BULEOCODIUM <i>vernum</i> . Sp. 1. fol. 422. Colchicum <i>vernum hispanicum</i> .	-	-	-
18	* CALLA <i>æthiopica</i> . Sp. 1. fol. 1373. Arum <i>æthiopicum</i> flore albo odorato, moschum olente.	-	-	20
19	* CANNA <i>Indica</i> flore luteo punctato. Sp. 1. fol. 1.	-	-	10



Nro

- 9 Äthiopische Antholyza, afrikanische Hyacinth mit Schwerdelblättern und scharlachrothen Blumen, blühet selten, muß warm unterhalten werden.
- 10 Schlangenbalg, Drachenwurz, mit großen dunkelrothen Ironsblumen, welche sehr übel riechen.
- 11 Die ägyptische große Ironswurzel, insgemein die rothblühende Colocasja.
- 12 Die große blau dunkelviolet stänglichte Censianische Colocasja mit sehr großen breiten Blättern.
- 13 Gemeine Ironwurz, wächst in dunklen Laubwäldern und feuchten schattichten Gegenden.
- 14 Rahmes Rohr, Schallmenenrohr, ein Schilfgewächs aus warmen Gegenden.
- 15 Bunt gestreiftes Indianisches Rohr.
- 16 Affodillen mit hohem Stängel, häufigen weißen Blumen, insgemein der Königsstab.
- 17 Spanischer früher Mattensafran, blühet im Frühling, mit röthlichten Blumen, dem Safran ähnlich.
- 18 Der afrikanische Iron mit weißen wohlriechenden Blumen, die weiße Colocasja.
- 19 Indianisches Blumenrohr mit gelben getüpfelten Blumen.

Nro 86

	Q.	℥.	fr.
20 * <i>b. CANNA Indica</i> flore coccineo. Cannacorus flore coccineo.	-	-	15
21 <i>COLCHICUM autumnale</i> flore variegato. <i>Sp. 1. fol. 485. B.</i> Colchicum commune flore rubro vel albo.	-	-	12
<i>b. Colchicum</i> flore pleno rubro & variegato.	-	-	20
22 <i>c. COLCHICUM variegatum.</i> Colchicum Chionense, floribus fritillaria instar tessulatis, foliis undulatis. Colchicum vernal. <i>sic</i> Bulbocodium. Corona Imperialis. <i>sic</i> Fritillaria.	-	-	30
23 ** <i>CRINUM americanum. Sp. 3. fol. 419.</i> Lilio Asphodelus americanus, semper virens, maximus polyanthus albus.	-	-	35
24 <i>CROCUS sativus officinalis. Sp. 1. fol. 50.</i> <i>a.</i> Crocus sativus autumnalis.	-	-	3
25 <i>CROCUS vernus. Sp. B.</i> Crocus vernus latifolius cum suis varietatibus.	-	-	2
<i>b. Crocus biflorus. Müll.</i> Crocus vernus striatus vulgaris.	-	-	4
26 <i>CYCLAMEN europæum. Sp. 1. fol. 207.</i> Cyclamen hederæ folio, flore purpureo & albido.	-	-	36



Neop

20 Scharlachfarbiges Blumenrohr aus Mechoacan.

21 Herbstzeitlose, Wiesenzeitlose, Mattensafran, von verschiedenen Farben.

b. Herbstzeitlose, von verschiedenen schönen gefüllten Blumen.

22 Krausblättrige Zeitlose von Chio, mit gewürfelten Blumen, blühet mit der vorigen im Herbst.

23 Das große amerikanische Erinum, Affodillilie, mit vielen großen weißen Blumen auf einem Stiele.

24 Der wahre Herbstsafran, dessen Blüthe in der Spezeren gebraucht werden.

25 Der zahme Frühlingsafran von mannigfaltigen Farben.

b. Der allerfrüheste ganz kleine gelbe Frühlingsafran, oder Crocus.

26 Gemeines Herbst - Schweinbrod mit Epheublatt, weißen und purpurrothen Blumen, hält unsere Winter aus, mit ihren schönen Blättern, Oesterreich und Italien ist ihre Heimath.

Nro 2

	Q.	R.	R.
27 * CYCLAMEN <i>purpurascens</i> . Müll. Cyclamen orbiculato folio inferne pur- purascente.	-	-	36
28 * CYCLAMEN <i>persicum</i> . Müll. foliis cordatis ferratis.	-	-	-
29 * CYCLAMEN <i>vernale</i> . Müll. Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso amplo, flore albo basi pur- purea, persicum dictum.	-	-	-
30 ERYTHRONIUM <i>dens canis</i> . Sp. 1. fol. 437. Dens canis latiore rotundioreque fo- lio, flore ex albo purpureo rubente.	-	-	-
31 b. ERYTHRONIUM <i>longifolium</i> . Müll. Dens canis angustiore longioreque fo- lio, flore ex albo purpurascente.	-	-	-
32 FRITILLARIA <i>imperialis</i> . Sp. 1. fol. 435. Corona imperialis major.	-	-	6
33 b. Corona Imperialis flore pleno rubro.	-	-	24
34 c. Corona Imperialis flore pleno luteo.	-	-	-
35 d. Corona Imperialis foliis ex luteo & vi- ridi maculatis.	-	-	35
36 e. Corona Imperialis foliis ex albo varie- gatis.	-	-	-
37 f. Corona Imperialis flore duplici tripli- cive.	-	-	30



Nto

- 27 Rundblättriges Schweinbrod, welches auf der untern Seite purpurroth ist, die Blätter und Blumen sind zu gleicher Zeit im Herbst purpurroth, mit dunkelrothem Boden, haben einen sehr angenehmen Geruch.
- 28 Das Persische Schweinbrod mit herzförmigen Blättern, fleischigen purpurrothen Stielen, und ganz weißen Blumen, welche einen glänzenden purpurrothen Boden haben, blühet im März und April.
- 29 Schweinbrod mit großen eckigten herzförmigen Blättern, mit großen blaß purpurrothen Blumen, mit einem hellrothen Boden, kommen im März und April.
- 30 Der rund und breitblättrige Hundszahn von weiß purpurrothen vermischten Farben, blühet im April.
- 31 Hundszahn mit einem längern und schmälern Blatt, und purpurrother weißlichten Blume, wächst in Ungarn und Italien, wild.
- 32 Die große Kaiserkrone mit rothen und gelben Blumen.
- 33 Kaiserkrone mit roth gefüllten Blumen.
- 34 Kaiserkrone mit gelb gefüllten Blumen.
- 35 Kaiserkrone mit gelb und grün gestreiften Blättern.
- 36 Kaiserkrone mit weiß und grün gestreiften Blättern.
- 37 Die zwey- und dreyfach gekrönte Kaiserkrone.

Von diesen giebt es noch viele Abartungen.

Nro 6

	Q.	fl.	fr.
38 FRITILLARIA <i>Melegris</i> . Sp. 5.	-	-	8.
Fritillaria præcox, purpurea, variegata.			
b. Fritillaria alba variegata.	-	-	10
39 FRITILLARIA <i>aquitonica</i> . Müll.	-	-	15
Fritillaria aquitonica majore flore luteo obscuro.			
Gladiolus æthiopicus. <i>sic</i> Antholyza.			
40 GLADIOLUS <i>communis</i> . Sp. 1. fol. 52.	-	-	4
Gladiolus floribus uno versu dispositis.			
41 ** GLORIOSA <i>superba</i> . Sp. 1. fol. 437.	-	1	20
Lilium superbum Zeylanicum.			
42 HÆMANTHUS <i>coccineus</i> . Sp. 1. fol. 412.	-	1	30
Narcissus Indicus serpentarius.			
43 HÆMANTHUS <i>puniceus</i> . Sp. 3.	-	1	-
Hæmanthus Colchici folio perianthio herbaceo.			
44 HEMEROCALLIS <i>flava</i> . Sp. 1. fol. 462.	-	-	6
Lilio Asphodelus luteo flore odorato.			
45 HEMEROCALLIS <i>fulva</i> . Sp. 2.	-	-	8
Lilio Asphodelus puniceo flore inodoro.			
Hyacinthus Indicus stellatus. <i>sic</i> Scilla.			
46 HYACINTHUS <i>orientalis</i> . Sp. 6. fol. 453.	-	-	3
Hyacinthus orientalis cum suis varietatibus.			
47 HYACINTHUS <i>muscarum</i> . Sp. 7.	-	-	10
Hyacinthus racemosus moschatus.			

- 38 Die frühe, purpurrothe, scheckigte Schachtblume, Fritillaria, Sibizener genannt.
b. Die frühe weiße gescheckte Schachtblume.
- 39 Die groß blühende Fritillaria, oder Schachtblume, mit weiß gelblichten, oder auch roth, gefleckten Blüthen, ist die schönste.
- 40 Runde Schwertel, Allermannsharnisch, dessen Blumen auf einer Seite des Stängels stehen. Es giebt noch mehrere Abartungen.
- 41 Die Prachtlilie aus Ceyland, welche sehr hohe steigende Stängel machet, das Liliū superbum genannt.
- 42 Die afrikanische Blutblume, der breitblättrige große Hämānthus.
- 43 Blutlilie mit lanzenförmigen Blättern, welche den Wiesensafrans - Blättern gleichen, und schönen rothen Blumen.
- 44 Die kleinere gelbe Affodillenzilie, hat faserichte Wurzeln, an welchen Knollen sind, und wohlriechende Blumen.
- 45 Die größere rothe Affodillenzilie ohne Geruch. Beide Sorten sind dauerhaft, kommen in jedem Grunde leicht fort, vermehren sich häufig.
- 46 Der morgenländische Hyacinth mit allen seinen schönen Abartungen, insgemein die schöne Hyacinthenblume genannt.
- 47 Wohlriechender weißer Muscatenhyacinth.

Nro 6

	Q.	R.	L.
48 <i>HYACINTHUS monstrosus</i> . Sp. 8. Hyacinthus fanensis panicula, comosa	-	-	25
49 <i>HYACINTHUS comosus</i> Sp. 9. Hyacinthus comosus major purpureus.	-	-	-
50 <i>HYACINTHUS botryoides</i> Sp. 10. Hyacinthus botryoides purpureus.	-	-	10
51 <i>HYACINTHUS plumosus</i> flore cœruleo. Jonquilla. Jache Narcissus Jonquilla.	-	-	15
52* <i>IRIS fusiana</i> . Sp. 1. fol. 55. Iris fusiana flore maximo & albo nigri- cante.	-	1	10
53 <i>IRIS florentina</i> . Sp. 2. Iris alba florentina.	-		8
54 <i>IRIS germanica</i> . Sp. 3 Iris vulgaris germanica sive sylvestris.	-		6
55 <i>IRIS variegata</i> . Sp. 7. Iris latifolia panonica colore multipli- ci.	-	-	8
56 <i>IRIS biflora</i> . Sp. 8. Chamae Iris major, saturate purpurea biflora.	-	-	8
57 <i>IRIS pumila</i> . Sp. 9. Iris humilis minor, flore purpureo.	-	-	3
58 b. Iris pumila minor, flore purpureo cœruleo.	-	-	3
59 c. Iris pumila minor flore rubello.	-	-	3



Nro

- 48 Der blaue Federhyacinth mit schönen Blumen.
- 49 Großer purpurfarbiger Hyacinth.
- 50 Fleischfarbiger Traubenhyaacinth.
- 51 Blauer Federhyacinth.
- 52 Die Chalcedonische Schwertlilie, insgemein Iris sulsiana, ist die schönste.
- 53 Weiß gelblichte Florentinische Schwertlilie, deren Wurzel in den Apotheken als die Weilwurzel verkauft wird.
- 54 Gemeine deutsche purpurroth in das blaue fallende Iris mit gelbem Bart, der Stängel wird 3 Schuhe hoch, hat breite Blätter, und mehrere Blumen auf einem Stängel.
- 55 Die große breitblättrige Iris, auf deren ziemlich hohem Stängel zwey bis drey ganz gelbe, von innen purpurroth gestreifte Blumen über sich stehen.
- 56 Die größere Zwergiris mit einer dunkel purpurrothen blaulichten Blume, deren zwey bis drey an abgetheilten Nebenstielen stehen, blühet im May, ist niedrig.
- 57 Die kleinste Zwergiris von dunkel purpurroth violetter Farbe, blühet Anfangs May.
- 58 Die kleinste Zwergiris von heller purpurrothen Farbe.
- 59 Die Zwergiris mit röthlicht blau gestreifter Blume.

Nro 6		Q	fl.	fr.
60	d. Iris pumila minor, flore pallido & albo	-	-	5
61	e. Iris pumila minor flore variegato.	-	-	6
62	IRIS <i>pseudoacorus</i> . Sp. 10. Iris palustris lutea.	-	-	8
63	IRIS <i>fœtidissima</i> . Sp. 11. Iris fœtidissima seu Xyris.	-	-	4
64	b. Iris fœtidissima foliis ex albo & viridi maculatis.	-	-	3
65	IRIS <i>sibirica</i> . Sp. 12. Iris pratensis, angustifolio non fœtida altior.	-	-	5
66	IRIS <i>versicolor</i> . Sp. 13. Iris americana versicolor stylo crenato & non crenato.	-	-	5
67	IRIS <i>spuria</i> . Sp. 16. Iris pratensis angustifolia, folio fœtido	-	-	6

- 60 Zwergiris mit perlenblauen und weißlichten Blumen.
- 61 Zwergiris mit vielfärbigen Blumen.
Sind Abartungen.
- 62 Schwertlilie mit rauhen gelben Blumen auf einem hohen Stängel, wächst in Sümpfen.
- 63 Die stinkende Iris, deren grasgrüne schwertförmige Blätter einen unangenehmen Geruch, wann sie zerbrochen werden, von sich geben, mit kleinen purpurroth gestreiften Blumen.
- 64 b. Eine Abartung mit weiß und grün gestreiften Blättern.
- 65 Iris mit schmalen dunkelgrünen schwertförmigen Blättern, mit mehreren Blumen auf einem hohen Stiel, mit hellblauen Blumen, und dunkelblauen herabhängenden Nebenblättern, welche von der Mitte einen weißen Streif haben, wächst auf den Wiesen in Oesterreich.
- 66 Iris mit schmalen hellgrünen einen Schuh hohen schwertförmigen Blättern, deren Stängel etwas höher mit zwei bis dreien Blumen, welche hellblau, und die herabhängenden purpurroth sind, und in der Mitte einen weißen Streif haben.
- 67 Schmalblättrige Wieseniris, mit niedrigen Stängeln, an welchen dreien oder vier Blumen sind, welche hellblaue Fahnen, und purpurrothe hangende Blätter ohne Bärte, sondern nur weiße Strichen haben.

Nro 66

	Q.	fl.	fr.
68. <i>IRIS graminea</i> . Sp. 17. Iris angustifolia, prunum redolens minor.	-	-	6
69 <i>IRIS verna</i> . Sp. 18. Iris Virginiana pumila sive Chameris verna angustifolia, flore purpureo cœruleo odorato.	-	-	10
70 <i>IRIS Xyphium</i> . Sp. 20. Xyphium angustifolium, flore ex violaceo purpureo, & variorum colorum.	-	-	10
71 <i>IRIS persica</i> . Sp. 21. Iris persica bulbosa, præcox flore variegato.	-	-	18
72 <i>b. Xyphium latifolium</i> . Müll. Xyphium latifolium, caule donatum flore cœruleo.	-	-	10
73 * <i>IXIA crocata</i> . Sp. 8. fol. 51. Sysirinchium africanum minus flore rubente macula notato.	-	-	24

74 *Ixia*

- 68 Kleine ganz schmalblättrige Iris, deren Blätter viel länger als die Blumenstiele sind, an welchen keine Bärte, sondern gelbe Blumenblätter mit purpurrothen Streifen sind, die einen Pflaumengeruch haben.
- 69 Virginische Zwergiris mit schmalen grasartigen Blättern, ganz niedrigem Stängel, auf welchem eine wohlriechende purpurrothe Blume mit lichtblauen Fahnen in der Mitte steht, blühet im May.
- 70 Spanische Zwiefeliris mit ganz schmalen zugespitzten Blättern, mit licht- und dunkelblau von der Mitte gelb gestreiften wohlriechenden Blumen, blühet gegen Ende May. Man hat noch mehrere Abartungen von selbiger.
- 71 Die früheste und niedrigste persianische Zwiefeliris, mit ganz niedrigen Blumenstängeln, und kenntlichen gespitzten Blättern, mit schön blau, violet, weiß, gelb, und purpurroth gefleckten Blumen, blühet Anfangs April, von recht angenehmen Geruch.
- 72, b. Die breitblättrige größte englische Zwiefeliris, mit größten Blumen, mannigfaltigen Farben, als lichtblau, mit dunkelweiß gefleckt, dunkelblau, gelb, und purpurroth gestreift, blühet Ende Juny und July.
- 73 Die afrikanische Ixia, Crocuszwiefeln mit kleinen dünnen schwertförmigen Blättern, und scharlachrothen Glockenblumen, blühet im May.

Nro 8

	Q.	N.	Sc.
74 <i>IXIA chinensis</i> Sp. 9. Bermudiana radice carnosâ, floribus maculatis, seminibus pulpa obductis.	-	-	12
75 <i>KAEMPFERIA galanga</i> . Sp. 1. fol. 3.	-	-	20
<i>Lilium superbum</i> . siehe Gloriosa.			
<i>Lilio-Aspodelus</i> . siehe Hemerocallis.			
76 <i>LILIUM candidum</i> . Sp. 1. fol. 433. Lilium album flore erecto & vulgare.	-	-	6
77 b. <i>Lilium candidum</i> foliis ex luteo ma- culatis.	-	-	25
78 c. <i>Lilium candidum</i> flore pleno.	-	-	15
79 d. <i>Lilium</i> flore cœruleo punctato.	-	-	20
80 <i>LILIUM bulbiferum</i> . Sp. 2. Lilium purpureo croceum majus.	-	-	10
81 b. <i>Lilium bulbiferum</i> croceum minus.	-	-	12
82 <i>LILIUM martagon</i> . flore miniato. Sp. 6. Lilium floribus reflexis montanum.	-	-	15
83 b. <i>Lilium martagon</i> flore albo.	-	-	12
84 c. <i>Lilium martagon</i> flore incarnato ple- no.	-	-	-
85 d. <i>Lilium martagon</i> pyramidale.	-	-	20



Pro

74 Die Chinesische Tria, Tigerblume, mit rothen inwendig purpurroth getigerten Blumen

75 Ostindische Raempferiablume, mit knottigten Wurzeln. bleibt sehr niedrig, hat eine schöne weiße Blume ohne Stiel, mit purpurfarben Grund.

76 Weiße gemeine Lilie mit gerade stehender wohlriechenden Blume.

77 b. Weiße Lilie mit gelb makulirten Blättern.

78 c. Weiße Lilie mit gefüllten Blumen.

79 d. Weiße Lilie mit blau punctirten ins blaue spielenden Blumen.

80 Gelbe Feuerlilie, die größere Lilie, mit einer purpurrothen safrangelben Blume, inßgemein die Pomeranzensilie.

81 b. Die kleinere Feuerlilie, oder Pomeranzensilie, mit rothen Blumen, ist in Deutschland zu Haus.

Hievon giebt es mehrere Abartungen.

82 Der gemeine Türkische Bund mit roth gefleckter Blume.

83 b. Der Türkische Bund mit weißer Blume.

84 c. Großer Türkischer Bund mit gefüllten röthlichten Blumen.

85 d. Hoher pyramidenförmiger Türkischer Bund mit röthlichten Blumen.

Nro	Q	R.	Re.
86 e. <i>Lilium martagon</i> flore rubro punctato.	-	-	15
87 f. <i>Lilium martagon</i> flore coccineo.	-	-	-
Martagon. siehe <i>Lilium martagon</i> .			
88 ** <i>MARTYNIA perennis</i> . Sp. 1. fol. 862.	-	-	35
Martynia foliis ferratis.			
89 <i>NARCISSUS poeticus</i> . Sp. 1. fol. 414.	-	-	5
Narcissus albus, circulo purpureo.			
90 b. <i>Narcissus poeticus</i> flore multiplici.	-	-	10
91 <i>NARCISSUS pseudo narcissus</i> . Sp. 2.	-	-	6
Narcissus sylvestris pallidus calice luteo.			
92 b. <i>Narcissus pseudo narcissus sylvestris</i>	-	-	6
multiplex calice carens.			
93 c. <i>Narcissus pseudo narcissus luteus syl-</i>	-	-	10
vestris duplici triplicive tubo aureo.			
94 <i>NARCISSUS bicolor</i> . Sp. 3.	-	-	10
Narcissus medio luteus bicolor.			
95 <i>NARCISSUS minor</i> . Sp. 4.	-	-	8
Narcissus incomparabilis, flore pleno,			
partim flavo, partim croceo.			
96 <i>NARCISSUS moschatius</i> . Sp. 5.	-	-	7
Narcissus albus, foliis reflexis, calice			
brevi aureo.			
97 <i>NARCISSUS Tazetta</i> . Sp. 7.	-	-	10
Narcissus luteus polyanthos Lusitani			
cus, vulgo Tazetta.			
98 b. Tazetta flore majori albo calice luteo.	-	-	10



Nro

- 86 e. Purpurrother Türkischer Bund mit dunkelroth gefleckten Blumen.
- 87 f. Der kleinere scharlachrothe Türkische Bund.
- 88 Die Martynia mit glockenförmigen lichtblauen Blumen.
- 89 Weiße wohlriechende Narcisse mit purpurrothem Kreis.
- 90 b. Gefüllte weiße wohlriechende Narcisse.
- 91 Blafgelbe Narcisse mit gelbem Kelch, insgemein der Mätzenbecher.
- 92 b. Gemeine gelbe gefüllte Narcisse ohne Kelch.
- 93 c. Gelbe gefüllte Narcisse mit goldgelbem, zwey oder dreyfachen Kelch, die Constantinopolitanische genannt.
- 94 Gemeine Narcisse mit gefüllter Blume, welche in der Mitte gelb ist.
- 95 Die unvergleichliche Narcisse mit gefüllter Blüthe, die theils gelb, theils safranfarbig ist, incomparabilis genannt.
- 96 Weiße Narcisse mit rückwärts gebogenen Blumenblättern, und kurzem goldfarbigem Kelch, die Narcisse von Sion.
- 97 Gelbe Portugiesische Narcisse mit vielen Blumen, insgemein die kleine gelbe vielblumige wohlriechende Tazette, ist gut zum Treiben.
- 98 b. Große weiße Tazette mit gelbem Kelch, und vielen Blumen.

Nro 8

	Q.	fl.	fr.
99 c. Tazetta flore majori luteo calice aureo	-	-	15
100 d. Tazetta flore pleno subluteo calice aureo verno.	-	-	20
			3
101 NARCISSUS <i>Jonquilla</i> . Sp. 11.	-	-	8
Narcissus juncifolius luteus minor.			
102 b. Jonquilla minor flore luteo odora- tissimo pleno multiflora.	-	-	15
103 c. Jonquilla major flore luteo.	-	-	8
104 d. Jonquilla major flore albo.	-	-	8
			1
105 ORNITHOGALUM <i>capense</i> . Sp. 11. fol. 440.	-	-	-
Ornithogalum africanum plantaginis roseæ folio, radice tuberosa.			
106 PÆONIA <i>officinalis</i> . Sp. 1. fol. 747.	-	-	6
flore pleno rubro.			
107 PÆONIA <i>fœmina</i> . Müll.	-	-	6
Pæonia communis vel fœmina.			
108 b. Pæonia fœmina flore albido plenif- limo.	-	-	12
109 c. Pæonia fœmina flore minori albo.	-	-	12
110 PÆONIA <i>tartariba</i> . Müll.	-	-	15
Pæonia flore parvo, flore purpureo vi- olaceo.			

99 c. Große gelbe Tazette mit goldgelbem Kelch und großen Blumensträußen, ist die schönste.

100 d. Die vielblumige große gefüllte Tazette, weiß und gelb, mit goldfarbigem Kelch, ist die schönste und früheste, beste zum Treiben.
Von diesen giebt es noch mehrere Abartungen.

101 Gemeine gelbe binzenblättrige Narcisse, insgemein die Jonquillie.

102 b. Die kleine gelbe wohlriechende gefüllte Jonquillie, ist die schönste, hat mehrere Blumen an einem Stiel.

103 c. Die größere gelbe wohlriechende Jonquillie.

104 d. Jonquillie mit ganz weißen Blumen, und gelbem Kelch.

Von diesen findet man bey den Blumisten mehrere Abartungen.

105 Afrikanische Sternblume mit weißen Blumen, der größere Milchstern genannt, blühet im November in Glashäusern, ist von keiner besondern Schönheit.

106 Die gemeine rothe gefüllte Pätonie, Pätonienrose, auch die Eichtrose genannt.

107 Gemeine Eichtrose mit kleinern dunklern purpurrothen Blumen.

108 b. Eichtrose mit gefüllter blaßrothen Blume.

109 c. Kleinere ganz weißlichte Eichtrose.

110 Die Tartarische kleinere Eichtrose, mit stark gefüllter dunkel purpurvioleten Blume.

Nro 2

	Q	R.	Et.
111 <i>PÆONIA lusitanica</i> . Müll. Pæonia lusitanica flore minori plenissi- mo violaceo odorato.	-	-	8
112* <i>PANCRATIUM zeylanicum</i> . Sp. 1. fol. 417 Narcissus Zeylanicus flore albo hexa- gono odorato.	-	-	15
113** <i>PANCRATIUM caribæum</i> . Sp. 3. Pancratium mexicanum, flore gemello candido.	-	-	18
114* <i>PANCRATIUM maritimum</i> . Sp. 4. Lilio Narcissus albus maritimus minor.	-	-	20
115 <i>PANCRATIUM illyricum</i> . Sp. 6. Narcissus Illyricus lilaceus.	-	-	15
116 <i>POLYANTHUS tuberosa</i> . Sp. 1. fol. 453. Ilyacinthus Indicus tuberosus flore nar- cissi, vulgo Tuberosa.	-	-	4
117* b. Tuberosa flore pleno.	-	-	5
118* c. Tuberosa foliis ex luteo & viridi maculatis.	-	-	10
119 <i>RANUNCULUS bullatus</i> . Sp. 8. fol. 772. β Ranunculus lusitanicus, folio subrotun- do, parvo flore luteo.	-	-	6
120 <i>RANUNCULUS aconitifolius</i> . Sp. 16. Ranunculus montanus aconitifolio, flo- re albo multiplici.	-	-	10



Nro

- 111 Die ganz kleine spanische Gichtrose, mit kleinern ganz gefüllten violet purpurrothen Blumen.
- 112 Cenlanische Lilie mit weißen sechseckigten wohlriechenden Blumen.
- 113 Mexicanisches Pancracium, mit zwei weißen Blumen ohne Geruch.
- 114 Spanische große Meerlilie, mit großen weißen Blumen, blühet im August, im Junn muß selbe versetzt, und Winters vor der Kälte verwahret werden.
- 115 Die Sicilianische größte Narcisslilie mit mehreren Blumen an einem hohen Stängel, blühet im Junn, und kann unsere Winter vertragen.
- 116 Die Tuberose, oder Indianischer Hyacinth mit wohlriechender Narcissen weißen Blume.
- 117 b. Die schöne gefüllte Tuberose.
- 118 c. Die Tuberose mit gelb und grün gestreiften Blättern.
- 119 Kugelförmiger gelber Hahnenfuß, ganz gelbes glänzendes Schmalzblümlein.
- 120 Der Berg - Hahnenfuß mit Wolszwurz-Blättern, und weißen ganz gefüllten Blumen.

Beide Sorten sind, weil sie viel ähnliches mit den perennirenden Gewächsen haben, allda nachzusuchen.

Nro 2

121 RANUNCULUS asiaticus. Sp. 18.
Ranunculus foliis tripartitis laciniatis,
caule inferne ramoso, radice Tuber-
rosa.

122 SCILLA peruviana. Sp. 4. fol. 442.
Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus:

Tazetta. siehe Narcissus Tazetta.

Tuberosa. siehe Polyanthes.

123 TULIPA gesneriana. Sp. 2. fol. 438.
Tulipa turcarum.

Zingiber. siehe Amomum.



Nro.

121 Die gefüllte Garten-Ranunkeln mit allen ihren Abartungen.

122 Der blaue Peruvianische breitblättrige Sternhyacinth.

123 Die Tulpe mit allen ihren Abartungen und unzähligen Farben.

Von diesen giebt es folgende Abartungen; als

b. die frühzeitige.

c. die gefüllte.

d. die monstrose.

e. die bisarte.



Sechstes Verzeichniß.

Gewächse aus den wärmesten Gegenden,
Afrika, Amerika, und beyden Indien.

Nro	℥	fl.	fr.
1	AGAVE americana. Sp. 1. fol. 461.	-	12
2	Aloe americana muricata five maxima.	-	11
3	b. Agave americana foliis margine luteo maculatis.	-	15
3	AGAVE vera Crux. Müll. Aloe americana ex Vera Cruce, foliis latioribus & glaucis.	-	15
4	AGAVE vivipara. Müll. Aloe americana fobolifera, vulgo Aloe tuberosa.	-	45
Wird von einigen die gebährende, oder Jungen tragende Aloe genannt, weil sie junge Pflanzen nach der Blüthe hervortreibt.			
Aloe americana major. sich Agave.			
5	ALETRIS zeylanica. Sp. 3. fol. 456. α. Aloe zeylanica pumila foliis variegatis.	-	20
6	b. ALETRIS guinensis. Sp. 3. lin. β. Aloe Guinensis radice geniculata, foliis ex viridi & atro undulatim variegatis.	-	24
7	ALOE perfoliata. Sp. 7. fol. 457. Aloe foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus.	-	20

Sechstes Verzeichniß.

insgemein die
Indianische Gewächse genannt.

Nro

- 1 Die gemeine große amerikanische Aloe, wird sehr groß, blühet selten, ist dauerhaft unter den Orangenbäumen.
- 2 Die große amerikanische Aloe, mit gelb eingefasstem Blatt.
- 3 Amerikanische große Aloe mit breitem und vorn dünnem schwachen biegsamen Blatt, die Aloe von Vera Crux genannt. 1783 hat solche hier geblühet.
- 4 Die große lang- und grünblättrige Aloe ohne Stacheln, von Curasao, insgemein die Tuberosenaloe.
Wenn diese Sorte blühet, so kommen nach Abgang der Blume lauter junge Pflanzen hervor, welche gleich Wurzel fassen, diese treibt keine andere Bruth.
- 5 Die weiße Zenlanische niedrige Federaloe, mit glatten glänzenden grünen Blättern, und weißen Blumen.
- 6 Die niedrige breitblättrige Guinesische Federaloe, blühet selten, und vermehret sich gern.
- 7 Die wahre Aloe mit einem treibenden Stängel, und dicken gezähnten Blättern von Barbados.

Nro X		Q.	l.	fr.
8	a. Aloe africana caulescens, foliis magis glaucis caulem amplectentibus, & in mucronem obtusiores desinentibus	-	-	20
9	b. Aloe africana caulescens, foliis minus glaucis, dorsi parte suprema spinosa.	-	-	15
10	c. Aloe africana caulescens, foliis glaucis latioribus & undique spinosis.	-	-	14
11	d. Aloe africana caulescens, foliis glaucis brevissimis, foliorum summitate interna & externa nonnihil spinosis.	-	-	13
12	e. Aloe africana caulescens, foliis glaucis dorso integro spinosa.	-	-	15
13	f. Aloe africana caulescens perfoliata glauca & non spinosa.	-	-	10
14	g. Aloe africana maculata spinosa major.	-	-	12
15	h. Aloe succotrina angustifolia spinosa flore purpureo.	-	-	14
16	i. ALOE humilis. Aloe africana humilis, spinis inermibus, & verrucosis obsita.	-	-	10
17	k. ALOE vera. Aloe vulgaris vera & officinalis.	-	-	15
18	ALOEE variegata. Sp. 2. Aloe africana humilis, foliis ex albo & viridi variegatis.	-	-	18
19	ALOEE disticha. Sp. 3. Aloe africana flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato.	-	-	12

- 8 Die große graue Stängelaloe, mit gezackten stumpfspitzigen den Stängel umfassenden Blättern.
- 9 Die afrikanische Stängelaloe, mit minder grauen Blättern, die den Stängel umfassen, und an der Spitze auf dem Rücken Stacheln haben.
- 10 Afrikanische Stängelaloe mit breiten kurzen grauen Blättern, die den Stängel umfassen, und oberwärts überall Stacheln haben.
- 11 Afrikanische Stängelaloe, mit kurzen grauen Blättern, die überall gegen die Spitze mit kurzen Stacheln besetzt sind.
- 12 Graue afrikanische Stängelaloe, mit Blättern, die den Stängel umfassen, und einen ganz stachelichten Rücken haben.
- 13 Die hohe Stängelaloe, mit glatten dicken runden Blättern ohne Stacheln.
- 14 Die grüne großfleckige und stachelichte größere Aloe.
- 15 Die grüne schmalblättrige Aloe, mit purpurrothen Blumen.
- 16 Die Zigel - oder niedrige afrikanische, mit weichen Stacheln und Warzen überall besetzte Aloe.
- 17 Die wahre Aloe von Barbados, und Succotera, insgemein succotrinische Aloe.
- 18 Die grün und weiß gesprenkte niedrige afrikanische Aloe, die Rebhünerbrust-Aloe, die Papageyaloe.
- 19 Die gemeine Zungenaloe, die Carolinische Aloe, insgemein die Seifenaloe genannt.

Nro X

	Q	fl.	fr.
20 <i>b.</i> Aloe africana flore rubro, folio triangulari & verrucis albicantibus ab utraque parte notato.	-	-	10
21 <i>c.</i> Aloe africana foliis planis conjugatis corinatis verrucosis.	-	-	12
22 ALOE <i>spiralis</i> . Sp. 4. Aloe africana erecta, rotunda, folio parvo, & in acumen rigidissimum exeunte.	-	-	8
23 * ALOE <i>retusa</i> . Sp. 5. Aloe africana, brevissimo, crassimoque folio, flore viridi.	-	-	10
24 ALOE <i>viscosa</i> . Sp. 6. Aloe pyramidalis. Aloe africana erecta, triangularis, & triangulari folio viscoso.	-	-	12
25 ALOE <i>pumila</i> . Sp. 7. Foliis sessilibus bilabiatis, labio superiore erectiore, inferiore recurvato.	-	-	15
26 <i>b.</i> Aloe pumila margaritifera minor. Aloe africana margaritifera, foliis undique verrucis numerosissimis.	-	-	15
27 <i>c.</i> Aloe africana margaritifera minima.	-	-	16
28 * <i>d.</i> ALOE <i>arachnoides</i> . Aloe africana humilis arachnoides. Aloe africana minima, atroviridis, spinis herbaceis numerosis ornata.	-	-	15
29 ALOE <i>uvaria</i> . Sp. 8. Aloe africana folio triangulari longissimo & angustissimo, floribus luteis foetidis, vulgo Iris uvaria.	-	-	20
Ananas. sive Bromelia.			

- 20 Die gemeine niedrige Zungenaloe, mit brei-
tern dreneckigten Blättern, weißen Flecken,
und rothen Blumen.
- 21 Die niedrige afrikanische Aloe, mit flachen,
und mit Warzen überall besetzten Blättern,
- 22 Die aufrechte afrikanische und rundsäulige
Aloe.
- 23 Die niedrigste Polsteraloe genannt.
- 24 Die niedrige kleine aufrechte, und säulenförmige Aloe, mit dreneckigen hohlen flebrigen
Blättern.
- 25 Die gemeine Perlenaloe.
- 26 Die mittlere Perlenaloe, mit dunkelgrünen
breiten Blättern, und weißen kleinen War-
zen besetzt.
- 27 Die kleinste Perlenaloe, mit gespitzten dun-
kelgrünen Blättern, und weißen kleinen Züs-
peln besetzt.
- 28 Die afrikanische Spinnengewebe Aloe, ist die
niedrigste und zärteste, deren Blätter ganz
an dem Boden liegen, und mit weichen Stä-
cheln besetzt sind.
- 29 Die afrikanische Schwertblätter-Aloe, Des-
genaloe, mit den allerschönsten schmalen ei-
ner Degen - Hohl Klinge gleichenden Blät-
tern, und gelben stinkenden Blumen, die
Traubenaloe genannt.

Nro X

	Q	R.	R.
30 * ANTHERICUM <i>frutescens</i> . Sp. 7. fol. 444. Phalangium capense caulescens, foliis cepaceis, Aloe cepacea vulgo.	-	-	15
31 * ANTHERIUM <i>aloides</i> . Sp. 8. Phalangium capense sessile, foliis aloe formibus pulposis.	-	-	10
Asparagus Draco. succo Yucca Draconis.			
32 * BROMELIA <i>Ananas</i> . Sp. 1. fol. 408. Ananas aculeatus, fructu ovato, carne albida.	-	1	-
33 * <i>b.</i> Ananas foliis violaceis aculeatis, fru- ctu rubro rotundo, carne alba acida.	-	1	30
34 * <i>c.</i> Ananas foliis margine ex luteo ele- ganter variegatis.	-	2	30
35 * BROMELIA <i>pyramidalis</i> . Müll. Ananas aculeatus, fructu pyramidato carne aurea.	-	1	-
36 * BROMELIA <i>glabra</i> . Müll. Ananas lucide virens, folio vix ferrato.	-	1	30
37 * BROMELIA <i>karatas</i> . Sp. 3. Karatas foliis altissimis angustissimis & aculeatis.	-	-	45
38 * BROMELIA <i>viridis</i> . Müll. Ananas aculeatus, fructu pyramidato, ex viridi flavescente.	-	+	40

- 30 Das afrikanische Erdspinnenkraut, mit fleischigten Zwiebelblättern, und goldgelben in einer Spitze wachsenden Blumen, die Zwiefelaloe.
- 31 Das niedrige Erdspinnenkraut mit kleinen Aloeblättern.
- 32 Die gemeine Ananas mit runder länglicher Frucht und weißem Fleisch, ist was säuerlecht, die Früchten bleiben kleiner.
- 33 Ananas mit violeten stachelichten Blättern, dunkler pomeranzengelber runder Frucht, und weißem sauren Fleisch.
- 34 Ananas mit recht schön gelb gestreiften Blättern.
- 35 Ananas mit pyramidenförmiger Frucht und goldgelbem Fleisch, der Zuckerbred-Ananas genannt, ist die beste und größte Frucht.
- 36 Ananas mit glattem Blatt, die glatte Ananas genannt, hat eine ganz kleine saure Frucht, trägt ungern.
- 37 Ananas mit ganz blaßgelber außen stachelichter Frucht, sehr saurem Saft, mit längsten sehr stachelichten Blättern.
- 38 Ananas mit grasgrünen Blättern ohne Stacheln, die Tuberosen Ananas genannt Wen aller angewendeter Mühe habe ich keine zum Frucht tragen bringen können.

Nro X

	Q	fl.	fr.
39* <i>CACALIA anteuphorbium</i> . Sp. 2. fol. 1168. Anteuphorbium. Kleinia foliis carnosis planis ovato & longis.	-	-	12
40 <i>CACALIA kleinia</i> . Sp. 3. <i>CACALIA anthemum</i> folio nerii glabro.	-	-	10
41 <i>CACALIA ficoides</i> . Sp. 4. <i>Cacalia anthemum africanum</i> arboref- cens, ficoidis folio.	-	-	10
42* <i>CACTUS mamillaris</i> . Sp. 1. fol. 666. Echino melocactus minor, lactescens, tuberculis five mamillis majoribus.	-	-	45
43* <i>b. Cactus mamillaris</i> spinis albis. Echino melocactus minor spinis albis.	-	1	30
44* <i>CACTUS melocactus</i> . Sp. 2. Melocactus Indiæ occidentalis. <i>Carei angulati erecti.</i>	-	2	-
45 <i>CACTUS heptagonus</i> . Sp. 3. <i>Cereus erectus octangularis</i> , spinis & lana longioribus.	-	-	35
46 <i>CACTUS tetragonus</i> . Sp. 4. <i>Cereus erectus minor</i> , fructu spinoso, costarum numero varians.	-	-	45
47 <i>CACIUS hexagonus</i> . Sp. 5. <i>Cereus erectus maximus americanus</i> hexangularis, flore albo radiato.	-	-	48

- 39 Äthiopischer staudiger Cacalienstrauch, mit dicken glatten fleischigen länglicht runden Blättern.
 - 40 Der hohe baumartige Cacalienstrauch, mit weißen Blumen und Oleanderblättern.
 - 41 Der afrikanische hohe Cacalienstrauch, mit blaugrauen, langen und fleischigen Ficoïdes-Blättern.
 - 42 Die kleinere amerikanische Melonendistel, kleineres Zigelgewächs, mit dünnen schwarzen Stacheln, und scharlachrothen Früchten, ist die gemeinste.
 - 43 Melonendistel, die kleinste, oder das Zigelgewächs, mit ganz weichen häufigen weißen Stacheln.
 - 44 Die größere Melonendistel, oder Zigelgewächs mit langen scharfen brauen Nadeln.
- Die aufrecht stehende Cereus, oder Fackeldisteln.
- 45 Der aufrecht stehende dickste Cereus, oder Fackeldistel, mit sieben bis acht Ecken, verschiedenen langen weißen Dornen, und weißer Wolle.
 - 46 Kleiner aufrecht wachsender Cereus, mit vier zusammen gedruckten Ecken.
 - 47 Der größte aufrecht wachsende Cereus aus Surinam, mit großen weißen wohlriechenden Blumen, ist der höchste, gemeinste, und dauerhafteste.

Nro X

	Q.	fl.	fr.
48 CACTUS <i>repandus</i> Sp. 7. Cereus altissimus gracilior fructu extus luteo, intus niveo seminibus nigris pleno.	-	-	35
49 CACTUS <i>lanuginosus</i> . Sp. 8. Cereus Curassavicus erectus maximus, fructu rubro non spinoso, lanugine flavescente.	-	-	24
50 CACTUS <i>peruvianus</i> . Sp. 9. Cereus peruvianus spinosus, fructu ru- bro nucis magnitudine.	-	-	20
Cerei repentes radiculis lateralibus. vulgo Cereus serpens.			
51 ♀ CACTUS <i>grandiflorus</i> Sp. 11. Cereus gracilis scandens ramosus ple- rumque sexangularis, flore ingenti atque fragranti.	-	-	45
52 ♀ CACTUS <i>flagelliformis</i> . Sp. 12. Cereus minor scandens polygonus spi- nosissimus flore purpureo, vulgo Ce- reus serpens minor.	-	-	30
53 ♀ CACTUS <i>triangularis</i> . Sp. 14. Cereus triangularis scandens articula- tus.	-	-	24
54 b. Cereus ex luteo & viridi maculatis.	-	-	35
Opuntia compressa articulis proliferis. vulgo Ficus Indica.			
55 CACTUS <i>opuntia</i> . Sp. 16. Ficus Indica folio spinoso, fructu ma- jore.	-	-	10



Pro.

48. Die sehr lange schlanke aufrecht wachsende
Fackeldistel, mit acht bis neun zusammen
gedruckten Ecken, kurzen Dornen, und lan-
ger gelblicher Wolle.
49. Der lange aufrecht wachsende Cereus, mit
viel ungleichen Ecken, von Curasao, mit
gelblicher Wolle.
50. Die gerade wachsende dicke, vieleckige, Peru-
vianische Fackeldistel, mit stumpfen Win-
keln, und starken sich ausbreitenden Dornen.
Di: Kletternde oder in die Höhe steigende
Fackeldisteln.
51. Der in die Höhe rankende große Cereus, mit
vielen Ecken, und einer der prächtigsten wohl-
riechenden bey der Nacht blühenden Blus-
me, der große Schlangen-Cereus genant.
52. Der kleine kriechende, oder Schlangen-Ce-
reus mit vielen purpurrothen Blumen.
53. Der kriechende dreneckigte, mit Gliedern ver-
sehene Cereus, welcher ungemein hohe Rank-
en machet, und in allen Ritzen der Mauer
Wurzeln faßt.
54. Gelb und grün gestreifter dreneckigter Cereus,
eine schöne Abartung des vorigen.
Die Indianische Feige mit runden zusammen
gedruckten Blättern.
55. Die ganz kleine und gemeinste Indianische
Feige, mit gelben Blumen, ist die dauerhaf-
teste.

Nro X.

Nro X.	Q.	R.	Lr.
56 CACTUS <i>Ficus Indica</i> . Sp. 17. Opuntia, folio oblongo media.	-	-	20
57 CACTUS <i>tuna</i> . Sp. 18. Opuntia major folio oblongo rotundo, spinis longis & validissimis, flore lu- teo.	-	-	30
58 CACTUS <i>cochinillifera</i> . Sp. 19. Ficus Indica major levis, sive spinosa vermiculos proferens, Opuntia ma- xima dicta.	-	-	55
59 CACTUS <i>curassavicus</i> . Sp. 20. Opuntia minima americana spinosissima.	-	-	30
60 CACTUS <i>phyllanthus</i> . Sp. 21. Cereus scolopendri folio brachiato.	-	-	-
61 CHAMÆROPS <i>humilis</i> . Sp. 1. fol. 1657. Müll. vide Palma. Palma humilis sive chamæriphes.	-	1	55
62 COTYLEDON <i>orbiculata</i> . Sp. 1. fol. 614. Cotyledon africanum frutescens inca- num orbiculatis foliis.	-	-	35
63 COTYLEDON <i>spuria</i> . Sp. 2. Cotyledon africanum foliis depressis cruciatis.	-	-	30
64 COTYLEDON <i>hemispherica</i> . Sp. 3. Cotyledon capensis folio semiglobato.	-	-	20



Nro

- 56 Die größere Indianische Feige, mit länglichten Blättern, und borstigen langen Stacheln, die traubenweis von einem Punct zum andern wachsen, welche sich wie Strahlen ausbreiten, mit größeren gelben Früchten.
- 57 Die große Indianische Feige, mit den längsten und dicksten Blättern, auch längsten und stärksten Stacheln, mit gelben großen Blumen.
- 58 Die größte Indianische Feige, mit größern länglichten runden, mit vielen weichen kleinen Stacheln besetzten Blatt, und rothstreifiger Blume, inßgemein die Casinel - Feige.
- 59 Die allerstachelichste Indianische Feige aus Curasao, mit dem kleinsten Blatt.
- 60 Fackeldistel mit einem dünnen Nesselkraut-Blatt ohne Stacheln.
- 61 Die breitblättrige große Schirmpalme, von dickem hohen Stamm, wird zu Nro. 69 hienüber versetzt.
- 62 Das hohe baumartige Nabelkraut mit runden meergrünen Blättern, die einen rothen Saum haben, mit gelben großen Blumen.
- 63 Unächtes staudiges Nabelkraut mit jungenförmigen kreuzweis gesetzten glänzenden und dunkelgrünen Blättern.
- 64 Nabelkraut mit halb kugelrunden Blättern, und bis sechs Zoll langen Stängeln, mit röhrichen grünlichten, und purpurroth gekrüpfen Blumen.

Nro X

	Q.	l.	fr.
65 <i>CRASSULA coccinea</i> . Sp. 1. fol. 404. Cotyledon africana frutescens, flore umbelato coccineo.	-	-	48
66 <i>CRASSULA perfoliata</i> . Sp. 2. Crassula altissima perfoliata. Aloe africana caulescens perfoliata glauca, & non spinosa, vulgo Aloe cruciata.	-	-	20
67 <i>CRASSULA ciliata</i> . Sp. 10. Crassula caulescens, foliis sempervivi cruciatis.	-	-	35
68 <i>CRASSULA portulacaria</i> . Sp. 17. Crassula portulacæ facie arborescens.	-	-	40
69 <i>CYCAS circinalis</i> . Sp. 1. fol. 1658. Palma Indica caudice in annulos pro- tuberante distincto.	-	2	30
Echino melocactus. sive Cactus.			
70 <i>EUPHOREIUM canariensis</i> . Sp. 2. fol. 646. Euphorbia canariensis, quadrilatera, & quinquelatera, cerei effigie spinis ge- minis adunatis armatus.	-	-	24
71 <i>EUPHORBIA heptagona</i> . Sp. 3. Euphorbia heptagonum spinis longis- simis, in apice frugiferis.	-	-	28
72 <i>EUPHORBIA cereiformis</i> . Sp. 5. Euphorbium cerei effigie, caulibus gra- cilioribus.	-	-	20
73 <i>EUPHORBIA Caput Medusæ</i> . Sp. 3.	-	-	15
74 <i>b. Euphorbia humile procumbens</i> ramis simplicibus copiosis, caule crassissi- mo tuberoso.	-	-	20



Nro

- 65 Staudiges afrikanisches Fettkraut, mit scharlachfarbigen Blumen in dichten Kronen, insgemein das rothe Coryledon.
- 66 Das höchste, baumartige, graue äthiopische Fettkraut, mit Blättern, die um den Stängel zusammen gewachsen sind, wird sieben bis acht Schuh hoch, hat weiße Blumen.
- 67 Äthiopische Crassula, mit kreuzweis stehenden Hauswurz-Blättern, die sehr dicht buschigt wachsen, und lauter knottigte Zweige treiben.
- 68 Der Portulakbaum, wird zu einem ordentlichen schönen Baum.
- 69 Der Indianische Schirm-Palmbaum, dessen Blätter den Stängel wie Strahlen umfassen; wird zu Nro. 61 versetzt.
- 70 Großes Canarisches Euphorbium, in Gestalt eines Cereus, mit vier kurzen schwarzen gebogenen Stacheln besetzten Ecken.
- 71 Siebeneckiges Euphorbium, mit den längsten schwarzen Dornen, die an den Spitzen Blätter und Blumen tragen.
- 72 Dickstänglichtes Euphorbium mit einzelnen starken Dornen, dem Cereus gleichend, und häufige Blumen tragend.
- 73 Die ganz niedrige Euphorbia, Medusenhaupt.
- 74 b. Ganz kleines afrikanisches schuppige Zwerg-euphorbium, das Schlangen-Euphorbium, oder Medusenhaupt genannt.

Nro X

	Q.	l.	fr.
75 c. <i>Euphorbia procumbens</i> , ramis plurimis simplicibus squamosis, foliis deciduis.	-	-	35
76 <i>EUPHORBIA mauritanica</i> . Sp. 10. (foliis alternis, seminudum) <i>Tithymalus aphyllus mauritaniae</i> .	-	-	45
77 <i>EUPHORBIA Tithymaloides</i> . Sp. 12. <i>Tithymalus Curassavicus myrtifolius</i> , flore coccineo. Ficoides. <i>sic</i> <i>Mesembryanthemum</i> . <i>Fritularia crassa</i> . <i>sic</i> <i>Staphelia</i> .	-	-	48
78 <i>MESEMBRYANTHEMUM noctiflorum</i> . Sp. 5. fol. 689. Ficoides africana, erecta, arborescens, lignosa, flore radiato, primo purpureo, deinde argenteo, interdum clauso, noctu aperto.	-	-	20
79 <i>MESEMBRYANTHEMUM splendens</i> . Sp. 6. <i>Mesembryanthemum</i> foliis confertis splendidis flore pallido.	-	-	24
80 <i>MESEMBRYANTHEMUM Deltoides</i> . Sp. 11. Ficoides africana, folio triangulari crasso, brevi, glauco, ad tres margines aculeato. Müll.	-	-	15

- 75 c. Das größere schuppige Euphorbium, oder Schlangen - Medusenhaupt.
 - 76 Die Mauritanische Wolfsmilch mit aufrecht wachsenden starken Stängel, und braunen langen scharfen Stacheln.
 - 77 Euphorbium mit Myrtusblatt, und rother Blume, aufrecht wachsenden Stängel.
 - 78 Gerade stehendes holziges, knottiges, und gegliedertes höchstes Ficoïdes, mit großen wohlriechenden Strahlenblumen, welche Anfangs purpurroth, nachher silberfärbig, ben Tag geschlossen, des Nachts aber geöffnet sind.
 - 79 Glänzendes Ficoïdes, mit langrunden rückwärts gebogenen unterschiedenen in Büscheln wachsenden Blättern, und strahlenförmigen weiß oder blaßgelben Blumen, die äußerlich etwas roth, in Vormittagsstunden blühet, sich schließet, und sich einigemalen wieder öffnet.
 - 80 Afrikanisches Ficoïdes, mit kurzem dicken, grauen, dreieckigten Blatt, das an dreu Ecken Stralen hat, mit rosenfarben wohlriechenden Blumen.
- Man hat von dieser eine kleinere mit violeten, eine andere mit blaßrothen Blumen, sind Abartungen.


Nro X		Q	fl.	sc.
81	MESEMBRYANTHEMUM <i>barbatum</i> . Sp. 12 Ficus aizoides africana, folio variegato aspero, ad apicem stella spinosa armato.	-	-	20
82	<i>b.</i> Mesembryanthemum <i>barbatum</i> radiatum humile, foliis majoribus & minoribus.	-	-	18
83	MESEMBRYANTHEMUM <i>bispidum</i> . Sp. 13. Ficoides africana fructicosa, caule lanugine argenteo ornato, folio tereti, parvo, longo, guttulis argenteis quasi scabro, flore violaceo.	-	-	24
84	MESEMBRYANTHEMUM <i>uncinatum</i> . Sp. 17. Ficoides africana, folio triangulari glauco, perfoliato brevissimo, apice spinoso.	-	-	20
85	<i>b.</i> Mesembryanthemum <i>perfoliatum</i> foliis majoribus triacanthis.	-	-	24
86	MESEMBRYANTHEMUM <i>spinosum</i> . Sp. 18. Ficoides africana aculeis longissimis, & foliolis nascentibus ex foliorum alis.	-	-	15
87	MESEMBRYANTHEMUM <i>micans</i> . Sp. 32. Mesembryanthemum <i>micans</i> , flore phæniceo, filamentis atris.	-	-	20
88	MESEMBRYANTHEMUM <i>glaucum</i> . Sp. 35. Ficoides africana, caule lignoso, erecta, folio triangulari glauco, flore luteo magno.	-	-	24



Nro.

- 81 Afrikanisches Ficoïdes, mit rauhem scheidigen Blatt, dessen Spitze in Gestalt eines Stern mit dünnen Dörnern bewaffnet; mit schönen purpurins violete glänzenden Blumen, und gelben Staubfäden.
- 82 Ficoïdes mit größern Blättern, und mehreren auch längern Stacheln, eine viel kleinere Abartung der vorigen.
- 83 Staudenartiges Ficoïdes, mit Stängeln, welche silberne weiche Haare, und kleine langrunde Blätter, mit Flecken, die Silbertröpfen gleich sehen, und schöne violete Blumen haben.
- 84 Ficoïdes mit kurzen durchwachsenen dreneckigten Blättern, welche paarweis stehen, und den Stängel umfassen, mit einzelnen hell purpurfarbigen Blumen.
- 85 Afrikanisches Ficoïdes, mit größerm durchwachsenen Blatt, eine Abartung.
- 86 Ficoïdes mit langen Stacheln und kleinen Blättern, die aus den Flügeln der Blätter zum Vorschein kommen.
- 87 Das glänzende Ficoïdes, mit stumpfen dreneckigen warzigen Blättern, und schönen großen rothgelben Blumen, blühet meist den ganzen Sommer.
- 88 Afrikanisches Ficoïdes, mit gerade dünnem holzigen Stängel, dreneckigem fleischigten säbelförmigen rauhen Blatt, und recht schönen großen gelben Blumen.

Nro X		Q	fl.	ft.
89	MESEMBRYANTHEMUM <i>corniculatum</i> . Sp. 36. Ficoides africana, folio triangularis longissimo, marginibus obtusioribus, flore amplo, intus palide luteo, ex- tus linea rubra longa picto.	-	-	20
90	MESEMBRYANTHEMUM <i>dolabriforme</i> . Sp. 41. Ficoides capensis humilis, foliis cornua cervireferentibus, petalis luteis, no- diflora.	-	-	30
91 *	MUSA <i>paradisiaca</i> . Sp. 1. fol. 1477. Mula fructu cucumerino longiori, vul- go Pisang dicta. Palma dactylifera. suché Phoenix. Palma humilis. suché Chamarops. Palma Japonica. suché Cycas.	-	1	30
92 *	PHOENIX <i>dactylifera</i> . Sp. 1. fol. 1658. Palma dactylifera major vulgaris.	-	1	30
93	SEMPERVIVUM <i>arborcum</i> . Sp. 1. fol. 664. Sedum majus arborescens.	-	-	40
94	<i>l.</i> Sedum majus foliis ex luteo pulchre variegatis.	-	1	-
95	STAPHELIA <i>variegata</i> . Sp. 1. fol. 316. Fritularia crassa minor.	-	-	12
96	STAPHELIA <i>birsuta</i> . Sp. 2. Fritularia crassa major.	-	-	35



Nro

- 89 Ficoides mit langen fleischigten dreneckigten Blatt, stumpfen Einfassungen, und einer größern Blume, die inwendig blaßgelb, und auswendig röthlicht ist.
- 90 Ficoides vom Cap, mit großen dreneckigen beilförmigen Blättern, und gelben zu Nachts sich öffnenden Blumen.
- 91 Der Paradiesfeigenbaum, Adamsfeige, insgemein der Pisang mit gurkenähnlichen Früchten.
- 92 Gemeiner Palm oder Dattelbaum, dessen lange Blätter, ehe sie sich aus ihrem Neß entwickelt haben, die Juden zu ihrem Laubhüttenfest gebrauchen.
- 93 Die größere Baumhauswurz, oder das große baumartige Sedum.
- 94 b. Sedum mit recht schön gelb, weiß und grün gestreiften Blättern, ist viel zarter.
- NB. Steht auch unter Glashaus Gewächsen.
- 95 Die afrikanische Fritillaria mit kleinen glatten, gelb und purpur gescheckten Blumen, welche einen widrigen Geruch haben.
- 96 Die größere Fritillaria mit großen dunkel purpurrothen haarigen Blumen, von einem unleidentlichen Geruch.

Nro X

97 *Yucca gloriosa*. Sp. 1. fol. 456,
Yucca Indica, foliis aloes.

98 *Yucca aloifolia*. Sp. 2.
Yucca arborescens, foliis rigidioribus,
 rectis serratis.

99* *Yucca draconis*. Sp. 3.
Yucca draconis folio ferato.

100* *Yucca filamentosa*. Sp. 4.
Yucca foliis filamentosis.



Nro

- 97 Die gemeine niedrige Yucca, mit scharf zugespitzten Blättern, welche am Ende einen langen sehr scharfen braunen Dorn haben.
- 98 Baumartige Yucca, welche einen sehr hohen Stamm machet, und ihre schöne Blumen sehr dicht in einem langen Strauß bildet.
- 99 Yucca mit einem sägeförmig gezähnten Drachenbaum - Blatt.
- 100 Yucca aus Virginien mit ganz breit gedruckten rückwärts gebeugten weichen Blättern.



Der Preis ad 48 Kr. rheinisch.

Handwritten text in a cursive script, likely from a 17th or 18th-century manuscript. The text is arranged in several lines, with some words appearing to be in a different language or dialect. The ink is dark and the paper is aged and slightly discolored.

Continuation of the handwritten text, showing more lines of cursive script. The handwriting is consistent with the top section, suggesting a single scribe. The text is somewhat faded and the paper shows signs of wear and aging.

The bottom section of the page, containing the final lines of the handwritten text. The script remains cursive and the overall appearance is that of an old, possibly historical, document. The text is less legible due to fading and the age of the paper.

Nacherinnerung

an

Garten - und Kunstfreunde.

Lange schon hege ich den Gedanken, von den hier angezeigten Gartengewächsen eine eben so vollständige Beschreibung zu veranstalten, als ich von den Obstbäumen in der Pomona Franconica gab: nämlich vom ursprünglichen Vaterlande eines jeden Gewächses, von seinen Bestandtheilen, Laube, Blumen &c. von seinem Wachsthum, Vermehrung, Wartung und Pflege, die es fordert; lauter aus bewährten Urkunden, und besonders aus langer Erfahrung gesammelte Nachrichten:

Nebst feinem auf Kupfer gestochenen, und fein nach der Natur gemalten Bildniß, das auch alle seine Bestandtheile, Blüthe, Laube, Früchte, Saamen &c. einzeln vorstellen soll.

Die Ausführung aber dieses Gedan-
ken hängt von zwei Bedingnissen ab:
Erstens von dem Beyfall, den Garten-
liebhaber meiner gegenwärtigen Ar-
beit, diesem Verzeichniß geben werden.
Zweitens, ob das Publikum sich eine
Pränumeration, die wegen den vielen
darauf zu verwendenden Kosten noth-
wendig scheint, wird gefallen lassen.

Wenn die erste Bedingniß wird er-
füllt seyn, so werde ich von meinem Vor-
haben noch eine nähere Nachricht dem
Publikum geben, um die Art, wie ich das
neue Werk ihm zu liefern gedenke, viel-
leicht heftweis zu 6 oder 8 Tabellen, das
Quantum der Pränumeration, und die
Art der Einlage zu bestimmen; wozu
viele Tabellen durch einen geschickten Mi-
niaturmaler nach der Natur habe ma-
len lassen.

Der Verfasser. &c. &c.

Erster Anhang

vom Jahre 1784.



Erstes Verzeichniß

A.		☉	fl.	fr.
1	AMARANTHUS spinosus Lin. Sp. 22. fol. 1407. Blitum spinosum indicum.	-	-	5
2	BUPHTHALMUM aquaticum. Sp. 5. fol. 1274. Asteriscus annuus lusitanicus odoratus.	-	-	5
3	CHENOPODIUM ambrosioides. Sp. 10. fol. 320. Podris ambrosioides mexicana.	-	-	4
4	CREPIS barbata flore albo. Sp. 3. fol. 1131. Vulgo oculus Christi hieracium Calyce barcato.	-	-	5
5	CREPIS rubra. Müller. Hieracium dentis leonis folio flore suave rubente.	-	-	6
6	CUCUMIS prophetarum Lin. Sp. 2. fol. 1436. Colocynthis pumilla echinata arabica striis duodecium luteis & viridi- bus variegatis.	-	-	8
7	DELPHINIUM ajacis. Sp. 2. fol. 748. Consolida regalis flore majore & mul- tiplici.	-	-	4
8	HOLCUS sorghum. Sp. 2. fol. 1484. Miliun arundinaceum subrodundo fe- mine sorgho nominatum.	-	-	6
9	HELIANTHUS chinensis flore plenissimo Sp. Nova.	-	-	8




Sommer Gewächse.

- 1 Buschichter Amerant, Tausendschön, deren Zweige mit scharpfen Dornen besetzt seyn mit kurzen grünen Aehren.
- 2 Ochsenaug mit dichtstandenen Zweigen wachsenden Blättern und gelben Blumen.
- 3 Gänßfuß mit geschweiften Blättern, insgemein die Eiche von Jericho genannt.
- 4 Spanisches Habichtkraut, oder Rindsauge mit weißen Blumen.
- 5 Candrillenkraut, Habichtkraut, oder Rindsaug mit rothen schönen Blumen.
- 6 Coloquinten oder Propheten Gurken, mit kleinen runden gestreiften Früchten, welche ganz stachlicht seyn.
- 7 Großer garten Rittersporn, mit schönen mannigfaltigen gefüllten Blumen.
- 8 Indianischer großer Hirsche mit hohen Stängeln großen auseinander bürstenden Kolben und großen braunen Saamen.
- 9 Die jährige zwerg Sonnen Blume, mit schön gefüllt abänderlichen gelben Blumen.

⊙ A.

	Q	fl.	fr.
10 <i>HOLCUS saccharatus</i> Sp. 3. - fol. 1484. Miliun indicum saccharitiferum altissimum granis flavescentibus.	-	-	5
11 <i>HIBISCUS Cannabinus</i> Sp. 15. fol. 979. Ketmia indica foliis digitatis flore magno sulphureo umbene atro purpureo.	-	-	8
12 <i>HELIOTROPIMUM indicum</i> Sp. 2. fol. 187. Heliotropium americanum cæruleum.	-	-	10
13 <i>LATHYRUS tingitanus</i> Sp. 13. fol. 1032. Lathirus tingitanus filiquis orobi flore amplo ruberrimo.	-	-	4
14 <i>LATHYRUS Clymenum</i> Sp. 14. fol. 1032. Clymenum hispanicum flore vario filiqua plana.	-	-	5
15 <i>MEDICAGO muricata</i> Sp. 9. g. fol. 1098. Medicago cochleata dicarpos capsula spinosa rotundi minori.	-	-	3
16 <i>MEDICAGO orbiculata</i> Sp. 9. d. fol. 1097. Trifolium cochleatum.	-	-	4
17 <i>MESEMBRYANTHEMUM cristalinum</i> Sp. 2. fol. 688. Ficoides africana micis argenteis adspersa.	-	-	6
18 <i>MOLUCCELLA Lævis</i> Sp. 1. fol. 821. Melissa moluccana odorata.	-	-	5



10 Indianischer Hirsch mit Schilffartigen Stängeln, gelblichten Kernen und blatgedrückten Aehren.

11 Indianische Ketmia mit zerfetzten länglichten Blättern stachlichten Kelchen, einer groß schwefelgelben Blumen, und purpurfarbigen Stern.

12 Blaue amerikanische Sonnenwende, mit sehr langen rückwärts gebogenen Blumen Aehren, welche den ganzen Sommer hindurch blühen.

13 Blatter Erbsen aus Tangier mit einer Erbsen Schotte, und schönen rothen Blumen.

14 Spanische blatter Erbse, mit einer veränderten Blume und Schotten, die mit Gelenken versehen sind.

15 Klein rund stachlichter blatgedrückter schnecken Klee.

16 Kleiner ganz blatgedrückter gewundener schnecken Klee.

17 Das breitblättrige Ficoides oder glänzendes Eiskraut.

18 Blatte molucanische Mellissen.

⊙ A.

19 MOLUCCELLA *spinosa* Sp. 2.

fol. 821.

Melissa Moluccana foetida.

20 MOMORDICA *Cylindrica* Sp. 5.

fol. 1433.

Pepo reticulatus & sulcatus semine nigro.

21 PANICUM *italicum* Sp. 6.

fol. 83.

Panicum italicum sive panicula majore.

22 PHLOMIS *brasiliensis* Sp. nova.

23 PASSIFLORA *foetida*. Sp. 21.

fol. 1359.

Clematis indica hirsuta foetida.

24 RESEDA *undulata* Müller.

Reseda minor alba dentatis foliis.

25 SALVIA *spinosa* Sp. nova.

26 SALVIA *athiopica*. Sp. 29.


fol. 39.

Salvia foliis lanceolatis sinuato dentatis floribus verticilos compri-
mentibus.

27 SCABIOSA *transylvanica* Sp. 2.

fol. 141.

Scabiosa altissima annua, foliis agri-
moniae. non nihil similibus.



- 19 Stachlichte molucanische Melissen, mit purpurrothen Stängeln.
- 20 Arabische lange Luffa, oder egyptische Cucumber mit großen schwarzen Kernen.
- 21 Italienischer Fench, oder Korn, mit einer großen Aehre.
- 22 Jerusalem's Salben mit breiten tief gezackten Blättern auch rothen Blumen und stachlichten Häuption.
- 23 Stinkende Passionsblume mit einen harigen drespißigen Blatt, und einer weißen Blume.
- 24 Das weiße kleine Harnkraut mit gezänten Blättern.
- 25 Die stachlichte Salben mit weißen Blumen.
- 26 Die Aetiopische Salben mit zerschnittenen Blättern.
- 27 Höchste jährige Scabiosa mit kleinen blaß purpurrothen Blumen.

◎ A.

	Q	d.	fr.
28 SCORPIURUS <i>muricata</i> Sp. 2. fol. 1050. Scorpioides buplerifolio, filiquis levibus.	-	-	6
29 SCORZONERE <i>tingitana</i> Sp. 10. fol. 1114. Sonchus tingitanus papaveris folio flore luteo.	-	-	5
30 SILENE <i>armeria</i> Sp. 29. fol. 601. Lychnis vilcosa purpurea latifolia læ- vis.	-	-	4
31 Silene africana nova species.	-	-	3
32 SILENE <i>Gigantea</i> Sp. 13. fol. 593. Lychnis facie auricula urfi.	-	-	4
33 SOLANUM <i>lycoperisicum</i> Sp. 11. fol. 265. Pomum amoris.	-	-	4
34 SOLANUM <i>nigrum guinense. d.</i> Sp. 15. fol. 266. Solanum guinense, fructu magno in- star Cerasi.	-	-	5
35 SPILANTUS <i>brasiliensis. Sp. nova.</i>	-	-	6
36 TAGETES <i>erecta media</i> Sp. 2. fol. 1249. Vulgo africana media.	-	-	3
37 TRIFOLIUM <i>stellatum</i> Sp. 26. fol. 1083. Lagobus minor erectus capite globoso stellato.	-	-	4

28 Raupe Klee mit einem Haasenhörlein
Blatt und glatter Schotte.

29 Storzoner mit einem Papaver Blatt auch
großen gelben Blumen.

30 Purpurrothe flebrichte Inchnis insgemein
Iobels Rückenfünger genannt.

31 Afrikanische flebrichte Inchnis.

32 Inchnis, so den Behrenhörlein gleichet.

33 Liebes Apfel mit roth und gelben Früchten.

34 Nachtschatten mit großen schwarz glänzenden
den Kirschen förmigen runden Früchten.

35 Der brasilianische Goldknopf.

36 Kleine schwefelgelbe oder Pomeranzenfar-
bige Sammetblume.

37 Gesternter Gartenklee.

© A.

38 *Vicia benghalensis* Sp. 9.

fol. 1036.

Vicia benghalensis hirsuta & incana
siliquis pisi.

39 *VERBESINA alata* Sp. I.

fol. 1270.

Chrysanthemum americanum, *bidens*
alatum, flore parvo aurantiaco.

Q	fl.	fr.
-	-	4
-	-	5



38 Die bengalische schön blühende Wicke.

39 Indianisches Rinegundenkraut mit dunkel
gelben Pomeranzenblumen.



Erster
Zwente
Perennirende

V. A.		Gr.	l.	fl.
1	ASTER <i>cordifolius</i> Sp. 22. fol. 1229. Aster latifolius glaber humilis ramo- sissimus, flore parvo caeruleo, fo- liis ad basin cordatis.	-	-	10
2	BUPTHALMUM <i>grandiflorum</i> Sp. 8. fol. 1275. Aster luteus angustifolius.	-	-	12
3	CALTHA <i>palustris</i> flore pleno Sp. 1. fol. 784.	-	-	35
4	CAMPANULA <i>medium</i> Sp. 21. fol. 236. Campanula hortensis folio & flore oblango, vulgo violamariana.	-	-	10
5	CHRYSANTHEMUM <i>serotinum</i> lin. Sp. 3. fol. 1251. Bellis americana procerior, serotina ramosa flore amplissimo.	-	-	15
6	CYNOGLOSUM <i>omphaloides</i> Sp. 7. fol. 193. Symphitum minus boraginis facie.	-	-	10
7	ERYSIMUM <i>barbarea</i> flore pleno Sp. 2. fol. 922. Sysimbrium crucæ folio glabro flore pleno.	-	-	36
		8		

Anhang

Klasse.

Gewächse.



- 1 Sternkraut aus Kanada mit breiten glatten Blättern, niedrigen Stängel und klein blauen Blumen.
- 2 Das staudige schmalblättrige Rindsaug mit ganz gelben Strahlenblumen.
- 3 Gelbe gefüllte Rühle, oder Dotterblumen, liebet nassen und schattigen Grund.
- 4 Die langblättrige Glockenblume mit weißen auch himmelblauen großen langen schönen Blumen.
- 5 Das hohe staudig und spät blühende Maack liebenkraut.
- 6 Das breitblättrige niedrige frühe Nabelsaamenkraut, mit kleinen himmelblauen Blumen.
- 7 Winter Kresse oder St. Barbenkraut mit schön gelb gefüllten Blumen, dem Matrimonial gleichend.

V A:

	℥	℥.	℥r.
8 HEDYSARUM <i>coronarium. flore albo</i> Sp. 37. fol. 1058. Onobrychis, semine clypeato aspero majore flore albo.	-	-	8
9 HESPERISTRISTIS Sp. 1. fol. 927. Hesperis palida montana odoratissima.	-	-	6
10 HELIANTHUS <i>giganteus</i> Sp. 8. fol. 1278. Chrysanthemum virginianum altissi- mum angustifolium caulibus puni- ceis.	-	-	30
11 INDIGOFERA <i>tinctoria</i> Sp. 1. fol. 1061. Anil sive Indigo americana filiquis in fasculæ modum contortis.	-	-	30
12 LOBELIA <i>syphilitica</i> Sp. 13. fol. 1320. Rabunculus galeatus virginianus flo- re violaceo majore.	-	-	20
13 LINUM <i>perenne</i> Sp. 2. fol. 397. Linum perenne majus cæruleum ca- pitulo majore.	-	-	15
14 MIRABILIS <i>dichotoma</i> Sp. 2. fol. 252. Jalappa officinarum flore parvo.	-	-	15
15 RANUNCULUS <i>silliricus</i> Sp. 17. fol. 776. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major.	-	-	16



- 8 Spanischer großer Schildklee mit großen weißen Blumen.
- 9 Die braun blaße wohlriechende Nachtviole.
- 10 Allerhöchste rothstänglichte Sonnenblume mit langen schmahlen Blättern und vielen gelben Blumen.
- 11 Amerikanische Bastart Indig Staude.
- 12 Die virginische Cardinal Blum mit dunkel blauer Blumen.
- 13 Die hohe immer dauernde Siberische Lein Staude, mit großen himmelblauen Blumen.
- 14 Die falsche Zalappa mit einer klein rothen Blume.
- 15 Der rauh und schmahlblättrige große Illirische Hanenfuß mit einer der Affodil ähnlichen Wurzel und gelben Blumen.

V A.

16 * RUDBECCIA *hirta* Sp. 3.

fol. 1280.

Chrysanthemum helenifolio, umbone
floris grandiusculo prominente.

17 SILPHIUM *perfoliatum* Sp. 2.

fol. 1301.

Silphium foliis radicalibus cordato
ovatis inæqualiter dentatis cauli-
nis subinte gerrimis.

18 SILPHIUM *asteriscus* Sp. 3.

fol. 1302.

Asteriscus coronæ solis folio & facie.

19 TRADESCANTIA *virginiana*. lin. Sp. 5.

fol. 411.

Allium five molys virginianum.

20 VERBASCUM *phæniceum* Sp. 5.

fol. 254.

Blatariaperennis flore violaceo.

Cl. fl. fr.

40


24

20

20

15



- 
- 16 Die niedrige raubblättrige Rudbeckia, mit goldgelben langen Strahlenblumen und groß schwarz glänzenden erhöhten Büxen.
- 17 Virginische Goldblume mit durchwachsenen großen eyrunden glatten Blättern und einem schupigten gelber Kelchblume.
- 18 Die hohe nordamerikanische unächte Goldblumenstaude mit gelben Strahlenblumen.
- 19 Virginische Tradescantia mit füsrichten Wurzeln, blauen auch weißen Blumen.
- 20 Das beständige Mottenkraut mit blau oder purpurrothen Blumen und breiten rauhen Blättern.




Dritte

Deren Glas- und Treibhaus


* A.

	Q	d.	fr.
1 ♀ ARCTOTIS <i>aspera</i> Sp. 7. <i>fol.</i> 1307. Actothen jacobæ folio, radiis florum intus luteis extus purpureis.	-	-	10
2 ♀ ARCTOTIS <i>Calendula</i> Sp. 3. <i>fol.</i> 1306. Anemonospermus africana jacobæ maritimæ foliis, flore sulphureo.	-	-	24
3 ♀ BRYONIA <i>africana</i> Sp. 5. <i>fol.</i> 1433. ✱ Bryonia africana laciniata tuberosa radice floribus herbaceis.	-	-	30
4 ♀ CAPSICUM <i>dulce</i> . Müller. Capsicum conoide.	-	-	15
5 ✱ CARICA <i>pesoposa</i> Sp. 2. <i>fol.</i> 1466. 24 Bapaya ramosa fructu piriformi.	-	2	30
6 ♀ CINERARIA <i>anethoides</i> Sp. 13. <i>fol.</i> 1245. Solidago africana frutescens caerulea hyperici foliis plerumque conju- gatis.	-	-	30
7 ♀ CISTUS <i>lexipes</i> Sp. 15. <i>fol.</i> 739. Chamæ cistus erice folio luteis elatior.	-	-	36



Klasse.

Gewächse.



- 1 Ethiopische Arctotis mit vielen pomeranzen gelben Strahlenblumen und schwarzen Pugen.
- 2 Afrikanische Arctotis oder anemone mit einer goldgelben Ringelblume, und einen schwarzen Pugen.
- 3 Ethiopische Raunrübe mit einer bleibenden Wurzel kleinen grünen Blumen.
- 4 Indianische Pfeffer Staude mit großen dicken gedruckten rothen süßen Früchten.
- 5 Papaya Baum mit großen Ahorn Blättern, welche Winters abfallen und birnförmigen Frucht.
- 6 Staudiger unächter afrikanischer Jakobs Strauch, mit blauen Blumen.
- 7 Cistus Köselein Staude mit schmalen Hedenblättern von Montpellier und ganz kleinen weißen Blumen.

* A.

		Gr.	fl.	fr.
8	♀ CISTUS <i>libonaticus</i> Sp. 13. fol. 739. Cistus ledon angustifolius.	-	-	36
9	♂ CISTUS <i>ladanifera</i> Sp. 5. fol. 737. Cistus ladanifera hispanica.	-	-	40
10	♀ CYNANCHUM <i>erectum</i> Sp. 5. fol. 311. Apocinum erectum fructicosum folio subrotundo.	-	-	24
11	♀ CLEOME <i>spinosa</i> Sp. 9. fol. 939. Sinapistum indicum spinosum flore carneo folio trifido, vel quinque- fido.	-	-	12
12	♀ DIOSMA <i>rubra</i> Sp. 3. fol. 287. Erica æthiopica rosmarini sylvestris folio eleganter punctato flore te- trapetalo purpureo.	-	-	15
13	♀ ERIOCEPHALUS <i>africanus</i> Sp. 1. fol. 1310. Abrotanum africanum folio tereti tridentato.	-	-	20
14	♀ FUMARIA <i>capnoides</i> Sp. 5. fol. 984. Fumaria luteo montana.	-	-	15
15	♀ GOSSYPIUM <i>arboreum</i> Sp. 3. fol. 975. Gossypium arboreum caule levi.	-	-	30
16	♀ HYEISCUS <i>rosasinensis</i> Sp. 6. fol. 977. Alcea javanica arborefcens flore ple- no rubicundo.	-	-	40



- 8 Der Eistus Strauch mit großen zugespitzten flebrichten Blättern, und schöner großer weißer Blume.
- 9 Eistus Staude von Montpelier mit flebrichten wohlriechenden Blättern, welche Ladanum trägt.
- 10 Die aufrecht wachsende Hundskohlstaude, mit runden Blättern und weißen Blumen.
- 11 Die amerikanische stachlichte Eleome.
- 12 Wohlriechende afrikanische Spierra mit weißen Blättern und rothen Blumen.
- 13 Immergrünende unächter rauchköpfigte afrikanische Stabwurzelstaude.
- 14 Gelber Steinerdrauch mit citronengelben Blumen.
- 15 Der größte Baumwollenbaum mit einem holzigen Stamm und schwarzen Saamen.
- 16 Die Sinesische Rosen mit einer schöner röthlichten großen Blum.

* A.		Q	H.	fr.
17	♀ LAVENDULA <i>Stöchas</i> Sp. 4. <i>fol. 800.</i> <i>Stöchas purpurea.</i>	-	-	15
18	♂ LAVATERA <i>micans</i> Sp. 2. <i>fol. 972.</i> <i>Malva hispanica.</i>	-	-	24
19	♀ MARUBIUM <i>africanum</i> Sp. 6. <i>fol. 816.</i> Pseudo dictamnus africanus foliis sub- rotundis subtus incanis.	-	-	15
20	♂ MIMOSA <i>glaucia</i> Sp. 27. <i>fol. 1504.</i> Acacia non spinosa flore albo foliorum pinnis latiusculis glabris siliquis longis planis.	-	-	-
21	♀ PETIVERIA <i>alliacea</i> Sp. 1. <i>fol. 486.</i> Petiveria foliis oblongo-ovatis spicis largioribus terminalibus.	-	-	15
22	♀ SALVIA <i>aurea</i> Sp. 26. <i>fol. 38.</i> Salvia africana frutescens, folio sub- rotundo glauco flore magno aureo.	-	-	12
23	♂ SALVIA <i>americana</i> flore coccineo nova species.	-	-	15
24	♂ SALVIA <i>mexicana</i> Sp. 19. <i>fol. 37.</i> Salvia mexicana altissima facie helio- tropii.	-	-	20
25	♀ SANTOLINA <i>rosmarinifolia</i> Sp. 2. <i>fol. 1180.</i> Abrotanum foemina foliis rosmarini minus.	-	-	20

- 17 Arabischer Lavendel das purpurfärbige Stöckkraut.
- 18 Spanische staudige Lavatera oder Stauden-
Ibis mit einem rauhen zerfetzten Blatt,
und rother Blume.
- 19 Afrikanischer unächter Wirbeldiptam mit gerundeten herzförmigen Blättern und gelben
20 Blumen.
- 20 Hohe weißblühende Neacida ohne Stacheln
mit breiten glatten Blättern und langen
ganz glatten Schotten.
- 21 Petivaria mit Nachtschattenblättern und
stachelichten Früchten das amerikanische Hör-
nerkraut genannt.
- 22 Die baumartige große afrikanische Salben
mit großen orangen gelben Blumen und
weit geöffneten Kelchen.
- 23 Die hohe amerikanische Salben mit wollich-
ten Stängeln und scharlachrothen Blumen.
- 24 Baumartige mexicanische Salben mit schö-
nen blauen großen Blumen und lichtgrünen
rauen Blättern.
- 25 Das größere Enpressenkraut mit Rosmarin
Blättern und einen sehr angenehmen Ge-
ruch.

* A.

		Q.	fl.	fr.
26	♀ SANTOLINA decumbens, Müller Santolina minor & canescens.	-	-	15
27	♀ SMILAX aspera Sp. 1. fol. 1458. Smilax aspera fructo rubente aut nigro.	-	-	36
28	♀ TEUCRIUM virginianum Sp. 17. fol. 789.	-	-	20
29	♀ TEUCRIUM fructicans Sp. 9. fol. 787. Teucrium fructicans boeticum.	-	-	15
30	♀ THYMUS mastibina Sp. 8. fol. 827. Sampfucus sive marum mastihem redolens.	-	-	15
31	♂ URENE sinuata Sp. 2. fol. 974. Alcea indica frutescens foliis in laciniis varie dissectis.	-	-	20
32	♀ TETRAGONA fructicosa Sp. 1. fol. 684. Tetragona carpos africana rutilans foliis longis & dugustis.	-	-	10
33	♀ URTICA nivea Sp. 17. fol. 1398. Urtica racemifera maxima finarum, foliis subtus argentea lanugine villosis.	-	-	20





- 26 Riechendes graues Enpressenkraut mit feinen meergrünen Blättern.
- 27 Die rauhe Stéchwinde mit röthlichten oder schwarzen Behren.
- 28 Gamanderlein mit ungleich sägeförmig gezähnten Blättern und einer langen rothen Blumenähre und angenehmen Geruch.
- 29 Das spanische Teukrium, das spanische Gamanderstreichlein mit breiten lichtgrünen unten ganz wollichten Blättern und blauen Blumen.
- 30 Mastigihymean Mastigkraut Umbra kraut der edle Majoran.
- 31 Die Chinesische Urena mit eckigten rauhen Blättern.
- 32 Die afrikanische schmahlblättrige Tetragonienstaude mit viereckigten runden Saamenkapseln.
- 33 Der großästige chinesische Nesselstrauch mit großen breiten Blättern, die unterwärts weiß und ganz wollig seynd.



Sünftes

Zwiefel-

A.		Q	H.	fr.
1	ALEUCA <i>major</i> Sp. 1. <i>fol. 433.</i> Ornithogalum luteum virens indicum.	-	-	30
2	ALLIUM <i>molly</i> Sp. 32. <i>fol. 432.</i> Molly latifolium luteum odore allii.	-	-	24
3	ARUM <i>esculentum flore luteo</i> Sp. nova <i>Lin. fol. 1368.</i> Arum majus flore luteo.	-	-	48
4	CANA <i>glauca</i> Sp. 3. <i>fol. 1.</i> Cannocorus glaucophilus ampliore flore, iridis palustris facie.	-	-	50
5	CANA <i>indica latifolia variegata</i> Gle- ditſchis.	-	-	40
6	GLADIOLUS <i>tristis</i> Sp. 6. <i>fol. 53.</i> Gladiolus bifolius, & biflorus, fo- liis quadrangulis.	-	-	15



Verzeichniß

Gewächse.




- 1 Indianisches Albucca mit zimlich hohen Stängel pyramidenförmigen vielen gelbgrünen Blumen.
- 2 Das breitblättrige Nollu mit gelben Blumen, und Knoblauch Geruch.
- 3 Große gelbe ceylanische Colocastia mit gelben Blumen, eine neue Abartung.
- 4 Das hochstänglichte Canarische Blumenrohr mit langen zugespitzten grünen Blättern, und großen Blumen.
- 5 Das bundblättrige hohe indianische Blumenrohr.
- 6 Schwertlinien Allermannsharnisch, mit zwey gelbbraunen Blumen, und nafigten Blättern, der ixia crocata gleichend.



Sechstes

Gewächse aus den wärmesten Gegenden




X A.

	l.	fr.
1 CACTUS <i>cruciformis</i> Sp. nova. Opuntia erecta spinis copiosis luteis.	-	50
2 CACTUS <i>peregrina</i> Sp. 22. fol. 611. Malus americana spinosa portulacæ folio, fructu folioso semine reniformi splendente.	-	48
3 CRASSULA <i>laciniata</i> Sp. nova. Foliis dissectis majoribus.	-	30
4 CRASSULA <i>punctata</i> Sp. 14. fol. 406. Telephium frutescens floribus spicatis minimis folio triangulari crasso.	-	36
5 EUPHORBIA <i>officinarum</i> Sp. 6. fol. 648. Euphorbia cerei effigie caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum.	-	20
6 EUPHORBIA <i>nereii folia</i> Sp. 7. fol. 648. Euphorbium angulosum foliis nereii latioribus.	-	15

Verzeichniß

beyder Indien.




- 1 Die aufrechtwachsende indianische Feige, mit kreuzweis gegeneinander stehenden Blättern, welche ganz mit weichen gelben Stacheln besetzt sind.
- 2 Fackeldistel oder Cereusstrauch mit hohen schlanken gedörrten Zweigen, und immer grünen Poldurakblättern, der Cacalien Strauch, oder indianischer Apfelbaum genannt.
- 3 Aufrechtwachsende Crassula mit großen zerfetzten Blättern und Stängel, welcher mit schöngelben Traubenförmigen Blumen besetzt ist.
- 4 Afrikanisches Fettkraut oder Crassula, mit dicken rundherzförmigen Blättern, und einem durchwachsenden Stängel, und kleinen ährenförmigen Blumen.
- 5 Das gemeine dickastige Euphorbium, welche meist rund, das Euphorbium deren alten genannt, welches in der Oficinell gebraucht wurde.
- 6 Das baumartige Euphorbium mit ausbreitenden baumartigen Aesten, und graßgrünen Oliander Blättern.

✕ A.

	Q	H.	fr.
7 MESEMBRYANTHEMUM <i>bicolorum</i> Sp. 30. fol. 695. Mesembryanthemum frutescens flore coccineo.	-	-	40
8 MESEMBRYANTHEMUM <i>expansum</i> Sp. 37. fol. 697. Mesembryanthemum tortuosum, fo- liis sempervivi expansis.	-	-	36
9 MESEMBRYANTHEMUM <i>ligniforme</i> Sp. 44 fol. 697. Mesembryanthemum folio lignifor- mi crasso & longiori.	-	-	34
10 PORTULACA <i>anacampseros</i> Sp. 4. fol. 639. Telephiastrum folio globoso.	-	-	20
11 PORTULACA <i>paniculata</i> Sp. 6. fol. 640. Portulaca americana latifolia erecta.	-	-	15
12 SEMPERVIVUM <i>aracnoideum</i> Sp. 7. fol. 665. Sempervivum rubrum montanum gna- phaloides.	-	-	20



- 
- 7 Ficoides mit lang schmahl graßgrünen gespißten Blättern, schwachen Zweigen, einzeln sehr großen scharlachrothen glänzenden Blumen ist das schönste.
 - 8 Ficoides mit gekrönten Stängeln glatten dicken graßgrünen breiten gegeneinander stehenden Blättern, einzeln großen glänzenden strohgelben Blumen.
 - 9 Das ganz niedrige langdickeblättrige zungenförmige Ficoides, mit großen einzeln goldgelben Blumen.
 - 10 Der kapische niedrige Portulak mit großen violetten Blumen.
 - 11 Der amerikanische breitblättrige Portulak.
 - 12 Niedrige kleinblättrige amerikanische Hauswurz mit schönen rothen Blumen, das niedrige Spinnenkraut genannt.



Bayrische
Staatsbibliothek
München

1. Die erste Sache ist die, dass die
Welt nicht aus dem Nichts
entstanden ist, sondern aus
etwas, das schon da war.

2. Die zweite Sache ist die, dass die
Welt nicht aus dem Chaos
entstanden ist, sondern aus
etwas, das schon da war.

3. Die dritte Sache ist die, dass die
Welt nicht aus dem Chaos
entstanden ist, sondern aus
etwas, das schon da war.

4. Die vierte Sache ist die, dass die
Welt nicht aus dem Chaos
entstanden ist, sondern aus
etwas, das schon da war.

5. Die fünfte Sache ist die, dass die
Welt nicht aus dem Chaos
entstanden ist, sondern aus
etwas, das schon da war.

